



EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

**ETOPLAN<sup>®</sup> EC**

**Etkili madde :** 50 g/l Etofenprox  
2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

**GRUP**


**3,A**

**İNSEKTİSİT**

**ZEHİRLİLİĞİ :** Deride tahriş yapmaz. Kanserojen, teratojenik, mutajenik değildir.

**İLK YARDIM TEDBİRLERİ :** Hastayı ilaçla sahadan uzaklaştırınız. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkartınız, suni teneffüs yaptırınız. Deriye ve göze bulaşmışsa bol su ve sabunla yıkayınız. Yutulmuşsa derhal sakinleştirici ilaçlar vererek hastayı kusturunuz. Doktora başvurunuz. İlaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

**ANTİDOTU :** Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.



**TEHLİKE ÖZELLİĞİ :**



*Xn :*  
Zararlı



*N :*  
Çevre için tehlikeli

**İÇİNDEKİLER :**

Etofenprox ve diğer katkı maddeleri içerir.

**UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :**

**R22:** Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.

**R 50/53:** Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

**GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :**

**S2:** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

**S36/37:** Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.

**S46:** Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. (Mümkünse etiketini gösterin.)

**S61:** Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/ Güvenlik bilgi formuna başvurun.



#### KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ETKİ ETTİĞİ ZARARLILAR:

Bitkiler	Zararlı adı	Kullanma dozu	*PHI
Pamuk	Kırmızı Örümcek ( <i>Tetranychus spp.</i> )	500 cc/ da	14 gün
	Beyaz Sinek ( <i>Bemisia tabaci</i> )	250 cc/da	3 gün

\*PHI : Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

#### İLACI HAZIRLAMA VE UYGULAMA ŞEKLİ :

Gerekli miktarda ilaç uygun bir kap içerisinde, önce bir miktar su ile karıştırılır. Üçte ikisi su ile dolu ilaçlama tankının içerisine karıştırılarak eklenir. Sonra tank su ile tamamlanır. İlaçlama havanın serin ve sakın olduğu zamanda yapılmalıdır. İlaçlamalara hastalık görülmeden veya ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.

**Etkinliği :** Buharlaşmayı geciktirici formülasyonundan dolayı damlacıkların daha uzun süre havada veya yüzeyde kalmasını sağlar. Ani ve güçlü düşürücü etkiye sahiptir. Öldürücü etkisi çok hızlı ve mükemmeldir. Kovucu etkisi yoktur. Direnç gelişimine karşı diğer tüm insektisitlerden üstündür.

#### Özellikleri :

- Etofenprox Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen non-ester bir pretroid olup WHOPEs spesifikasyonlarına uygun bir aktif maddedir.
- İnsanlara, hayvanlara ve bitkilere en dost insektisittir.
- Ciltte, burunda ve gözde yanma kızarıklık, tahriş yapmaz.
- Öksürük, aksırık ve burun akıntısına neden olmaz.
- Astım, Bronşit ve solunum yetmezliği olanlara karşı en güvenli aktiftir.
- Uygulandığı yüzeyde koku yapmaz ve leke bırakmaz.

#### DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :

ETOPLAN EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3,A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ETOPLAN EC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (grup 3,A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### DEPOLAMA ŞARTLARI :

- İlaç orijinal ambalajı içinde, ağzı iyice kapalı olarak, gıdalardan uzakta çocukların ve hayvanların erişemeyeceği bir yerde, kilit altında muhafaza ediniz.
- İlaç imal tarihinden itibaren, serin ve kuru şartlarda ve açılmamış orijinal ambalajında fiziki ve kimyasal özelliklerini en az 2 yıl muhafaza eder.



Kırmızı Örümcek  
(*Tetranychus spp.*)



Beyaz Sinek  
(*Bemisia tabaci*)

#### KARIŞABİLİRLİLİK DURUMU :

Alkali özelliktekiler hariç, diğer insektisit ve fungusitlerle karıştırılarak uygulanabilir.

#### EMNİYETLE İLGİLİ HUSUSLAR :

- İlaçlamadan iyi sonuç alabilmek için ilgili önerilere mutlaka uyunuz.
- Boş ilaç ambalajını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.
- İlaçlamadan sonra alet ve makineleri bol su ile yıkayın.

#### İLAÇLAMA SIRASINDAKİ EMNİYET TEDBİRLERİ :

- Bütün ilaçlarda olduğu gibi ilaçlama sırasında mümkün olduğunca ilaç ile temastan sakınınız.
- Ağzınızı burnunuzu içine alan maske takınız.

#### İLAÇLAMA SONRASI EMNİYET TEDBİRLERİ :

- Boş ambalajı kesiniz, yakınız ve gömünüz tekrar kullanmayınız
- Kullanılmayan ilacı sulara dökmeyiniz.
- Kullanılmayan ilacı ambalajı içinde ağzı sıkıca kapalı olarak çocukların erişemeyeceği bir yerde ve gıdalardan uzata kilit altında saklayınız.
- Yıkayınız, iş elbiselerini değiştirip yıkayınız.



BÖCEK İLACI

İNSEKTİSİT

ETOPLAN  
EC

50 g l Etofenprox



47

