



ISLANABİLİR TOZ (WP)

**GOLDAN<sup>®</sup> 50 WP**

**ETKİLİ MADDE :** %50 Phosmet

**Kimyasal adı:** O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate; N-(dimethoxyphosphinothioylthio methyl) phthalimide.

GRUP


1B

İNSEKTİSİT

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :** Baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal.

**İLK YARDIM TEDBİRLERİ :** Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alın. Doktor çağırınız veya hastayı ilaç ambalajı ve etiketi ile birlikte doktora götürünüz. Baygınlık riski var ise hastayı yatay pozisyonda tutunuz. İlaç ile temas halinde, yemeden, içmeden ve sigara kullanmadan önce yüz ve ellerinizi yıkayınız. Şayet rahatsızlık hissedilir ise derhal işi bırakınız hastayı havadar bir yere alınız ilaç göze gelmiş ise göz kapaklarını açarak, gözünüzü suyla en az 15 dakika süreyle yıkayınız. Eğer yutulmuşsa kusturmayın, biraz su verin, sakın ve sıcak tutun. Bilinci yerinde değil ise kurtarma pozisyonunda güvenli bir yere taşıyın ve tıbbi yardım isteyin. Hastayı ilaç ambalajı ile birlikte derhal doktora götürünüz.

**ANTİDOT :** Antidotu Atropin Sülfat'tır. Belirtilere göre tedavi edilir.



Yeni Ürün



TEHLİKE  
ÖZELLİĞİ :



Xn :  
Zararlı



N :  
Çevre  
için  
tehlikeli

**İÇİNDEKİLER :**

Phosmet ve diğer katkı maddeleri içerir.

**UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :**

**R21/22:** Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.

**R 50/53:** Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir .

**GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :**

**S2:** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.


**S26:** Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

**S28:** Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.

**S36/37/3:** Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

**S46:** Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

**S61:** Çevreye salıverilmesinden kaçınınız. Özel kullanım talimatına / Güvenlik bilgi formuna başvurun.



#### KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR :

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu	*PHI
Elma	Elma Ağ Kurdu ( <i>Hyponomeuta malinellus</i> )	60 gr / 100 L su larva	14 gün
	Elma İç Kurdu ( <i>Cydia pomonella</i> )	150 gr / 100 L su	14 gün
	Kahverengi Örümcek ( <i>Bryobia rubricolus</i> )	120 gr / 100 L su larva, ergin	14 gün
Şeftali	Şeftali Güvesi ( <i>Anarsia lineatella</i> )	150 gr / 100 L su larva	14 gün
Patates	Patates Böceği ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> )	200 gr / 100 L su larva, ergin	14 gün
Meyve Ağaçları	Yaprak Bitleri ( <i>Aphididae</i> )	150 gr / 100 L su	14 gün
	San Jose Kabuklu Biti ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> )	200 gr / 100 L su (yaz mücadelesinde)	14 gün

\*PHI son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

#### İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

Gerekli miktar ilaç bir miktar su içerisinde bulamaç haline getirilerek, yarıya kadar su doldurulmuş ilaçlama aleti deposuna aktarılır. Gerekli miktar su karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan bu karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda uygulanır.

#### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ :

GOLDAN 50 WP adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre Grup 1B olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ; GOLDAN 50 WP'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1B harici) bitki koruma ürünlerini kullanılmasına özen gösteriniz.

#### KARIŞABİLİRLİK DURUMU :

Yüksek asit veya alkali karakterli ilaçlar hariç diğerleri ile karışabilir.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- Arılara zehirlidir.
- Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara ve suda yaşayan diğer canlılara zehirlidir. İlaç artıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çeşme yalaklarına bulaştırmayınız.
- Boş ilaçlama ambalajlarını hiç bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

#### DEPOLAMA DURUMU :

İlaç orjinal ambalanda, ağzı kapalı olarak güneş görmeyen, kuru, havadar ve serin bir yerde yiyecek ve yemlerde ayrı bir bölmede, kilit altında saklanmalıdır. Rutubet almadığı takdirde ve yıllık ortalama sıcaklığın 25°C yi geçmediği şartlarda asgari 2 yıl fiziksel ve biyolojik özelliklerini korur.



Elma Ağ Kurdu  
(*Hyponomeuta malinellus*)




Patates Böceği  
(*Leptinotarsa decemlineata*)



Yaprak Bitleri  
(*Aphididae*)



San Jose Kabuklu Biti  
(*Quadraspidiotus perniciosus*)



BÖCEK İLACI

İNSEKTİSİT

**GOLDAN**  
50 WP

%50 Phosmet



49