

# K Kurik®

SÜSPANSİYON  
KONSANTRE  
(SC)


GRUP 3 İNSEKTİSİT

**Etkili Madde:** 240 g/l Tau-Fluvalinate  
(RS)-alpha-cyano-3-phenoxybenzyl N - (2-chloro-alpha, alpha, alpha-trifluoro-p-tolyl) - D - valinate

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :** Mide bulantısı, merkezi sinir sisteminde felç, göz yaşarması, salya, halsizlik, burun akması, deride yanma ve kaşınma hissi.

**İLK YARDIM TEDBİRLERİ :** Acil durumlarda hastayı derhal ilaç etiketi ve ambalajı ile birlikte doktora götürünüz. Solunması halinde hastayı temiz havaya çıkarınız. Göze sıçraması halinde göz kapaklarını açık tutarak derhal en az 15 dakika bol su ile yıkayınız. Eğer geçmezse doktora başvurunuz. İlaçla temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. İlaçlı elbiselerinizi değiştiriniz. Yutulduğu takdirde kusturmayınız. Hastanın şuuru yerinde değilse yan yatırınız ve ağızdan hiç birşey vermeyiniz.

**ANTİDOTU ve Tedavisi İçin Gerekli Bilgiler:** Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme belirtilerine göre tedavi uygulanır.



**TEHLİKE ÖZELLİĞİ :**



Xn :  
Zararlı



N :  
Çevre için tehlikeli

#### İÇİNDEKİLER :

Tau-Fluvalinate ve diğer katkı maddeleri içerir.

#### UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

**R 22:** Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.

**R 38:** Cildi tahriş eder.

**R50/53:** Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

#### GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

**S2:** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

**S24:** Cilt ile temasından sakının.

**S46:** Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketini gösterin.

**S61:** Çevreye salınmasından kaçının. Özel kullanım talimatına / Güvenlik bilgi formuna başvurun.



**KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR :**

Bitki adı	Zararlı adı	Kullanma dozu ve dönemi	*PHI
Elma	İçkurdu ( <i>Cydia pomonella</i> )	30 ml/100 lt su	14 gün
	Yaprak Biti ( <i>Aphis pomi</i> )	10 ml/100 lt su	
Şeftali	Yaprak Biti ( <i>Myzus persicae</i> )	10 ml/100 lt su	14 gün
Antep Fıstığı	Antep Psillası ( <i>Agonosca targionii</i> )	20 ml/100 lt su	14 gün
Domates (tarla)	Yaprak Biti ( <i>Myzus persicae</i> )	20 ml/da	14 gün
Kiraz	Yaprak Büken ( <i>Archips rosana</i> )	30 ml/100 lt su	14 gün
Pamuk	Yaprak Piresi ( <i>Empoasca spp.</i> )	20 ml/da	14 gün

\*PHI : Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

**KULLANIM ŞEKLİ:**

İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç bir miktar su ile karıştırılarak depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. Kontak ve mide etkilidir. Bitkilerin her tarafının özellikle yaprak altı yüzeylerinin iyice ıslatılması gerekmektedir. Meyve ağaçlarında yüksek basınçlı pulverizatör veya atomizör kullanılarak bitkinin her tarafı ıslatılmak sureti ile elde edilir. Bunun içinde ince meme kullanılmalıdır. Tavsiye edilen dozun birim alana atılabilmesi için önce ilaçlama aletinin kalibrasyonu yapılır. Bunun için kullanılacak ilaçlama aletiyle belli bir alana (en az 100m<sup>2</sup>) sadece su pulverize edilerek dekara kullanılacak su miktarı hesaplanır.

**DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :**

KURİK adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için KURİK'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (grup 3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK:**

Alkali ilaçlar hariç bilinen birçok ilaçla karışabilir. Ancak çiftçiye kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi önerilir.



İçkurdu  
(*Cydia pomonella*)



Yaprak Biti  
(*Myzus persicae*)



Yaprak Büken  
(*Archips rosana*)



Yaprak Piresi  
(*Empoasca spp.*)

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :**

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Sulara ve akarsulara karıştırmayınız.
- İlacı ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Kullandıktan sonra ellerinizi ve yüzünüzü sabunlu su ile yıkayınız.
- Faydalı böceklerle selektif olduğundan entegre mücadele şartlarında uygunluk gösterir. Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını başka gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

**DEPOLAMA DURUMU :**

Normal(serin ve kuru) şartlar altında depolandığında imal tarihinden itibaren 2 yıl müddetle ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde bir değişiklik olmaz.



BÖCEK İLACI

İNSEKTİSİT

KURİK

240 g/l Tau-Fluvalinate



51

