

M

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

MARJINAL® 100EC

ETKİLİ MADDE : 100 g/l Pyriproxyfen
4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether

GRUP


7C

İNSEKTİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ : Normal kullanım şartlarında herhangi bir akut tehlike yaratmaz.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ : İlacın yutulması halinde hasta kusturulmalıdır. Teneffüs edilmiş ise hasta açık havaya çıkartılmalıdır. Gözlere sıçramışsa 15 dakika bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Üzerinize dökülmüş ise, ilaçlı elbiseleri çıkarın ve deriyi bol su ve sabunla yıkayın. Zehirlenme anında, Doktor çağırınız. İlacın etiket ve ambalajı birlikte götürülmelidir.

ANTİDOTU : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.



TEHLİKE ÖZELLİĞİ :



Xn :
Zararlı



N :
Çevre için
tehlikeli

İÇİNDEKİLER :

Pyriproxyfen ve diğer katkı maddeleri içerir

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

R20/22: Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R36: Gözleri tahriş eder.

R38: Deriyi tahriş eder

R65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

R 50/53: Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S24: Cilt ile temasından sakının.

S36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S60: Atığını ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin.

S61: Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına / Güvenlik bilgi formuna bakın



KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR :

BİTKİ ADI	ZARARLI ADI	DOZU	*PHI
Pamuk	Beyaz sinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	50 ml / da (larva)	28 gün
Patlıcan	Beyaz sinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	50 ml / da (larva)	3 gün
Domates (sera)	Beyaz sinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	50 ml / 100 Isu (larva)	1 gün
Biber (sera)	Beyaz sinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	50 ml / 100 Isu (larva)	3 gün
Hıyar (sera)	Beyaz sinek (<i>Bemisia tabaci</i>)	50 ml / 100 Isu (larva-pupa)	1 gün
Şeftali	Şeftali dut kabuklu biti (<i>Pseudaulacapis pentagone</i>)	50 ml / 100 l su (larva)	14 gün

*PHI son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

Gerekli miktardaki ilaç az bir suyla ayrı bir kaptan önce bulamaç haline getirilir. Yarınsına kadar su doldurulmuş ve karıştırıcısı çalışmakta olan ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır. İlaçlama yaparken yaprakların alt ve üst yüzeylerinin iyice ilaçlanmasına dikkat ediniz. İlaçlamayı sabahleyin veya akşam üzeri havanın çok sıcak olmadığı zamanlarda yapınız.

KULLANMA ŞEKLİ:

Pamuk Beyaz Sinek : Beyaz sinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva + pupa bulunduğu mücadeleye başlanmalıdır.

Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar (Beyaz Sinek) : Beyaz sinek ile bulaşık olduğu saptanan seraya köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva-pupa olduğunda kimyasal mücadeleye başlanır.

Şeftalide Dut Kabuklu Biti : Birinci ve ikinci döle karşı ilaçlamalar ilk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra yapılır.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :

MARJINAL 100 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 7C olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geçiktirmek için MARJINAL 100 EC'in aynı üretim sezonunu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 7C harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.



Beyaz sinek
(*Bemisia tabaci*)



Şeftali dut kabuklu biti
(*Pseudaulacapis pentagone*)

ETK EKL VE ÖZELLİKLER :

Böcek regülatörü etkisini 20-30 gün korur. İlaçlanmış bitkilerde bulunan ya da sonradan konan yumurtalar açılmaz. Larvalar ve nimferin gelişimi engellenir ve dönem değiştirme sırasında ölürler. Juvenil hormonu özdeşi olarak görev yapar.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU :

Alkali özellikteki hariç diğer insektisit ve fungusitlerle karıştırılarak uygulanabilir.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Bitki koruma ürünü normal serin ve kuru koşullarda 2 yıl süre ile depolanabilir.
- Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.

DEPOLAMA DURUMU ve DİĞER BİLGİLER:

Normal (Serin ve kuru) depolama şartlarında 2 yıl depolandığı takdirde ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.



BÖCEK İLACI

İNSEKTİSİT

MARJINAL
100 EC

100 g/l Pyriproxyfen



55