

M

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

Metto Ultra[®] sc

ETKİLİ MADDE : Epoxiconazole+thiophanate-methyl
1-2RS,3SR)-1-[3-(2-chlorophenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorophenyl)propyl]-1H-1,2,4-triazole
methyl benzimidazol-2-ylcarbamate 2- dimethyl 4,4-(o-phenylene) bis(3-thioallophanate)

GRUP

3,G1;1,B1

FUNGİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ : Baş ağrısı, bulantı, kusma, baş dönmesi, göz ve ciltte tahriş.

İLK YARDIM : Vücuda bulaşmışsa, bulaşık elbiseler derhal çıkarılmalı temas eden vucut kısımları bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Göz ile temasında en az 15 dakika göz kapağı açılarak yıkanmalı. İlaç yutulmuşsa, ağız bol su ile yıkanmalı ve bol miktarda su içirilmelidir. Zehirlenme durumunda doktor çağırılmalı ve ilacın etiketi gösterilmelidir.

ANTİDOTU VE TEDAVİ İÇİN GEREKEN BİLGİLER : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.



1Lt

**TEHLİKE
ÖZELLİĞİ :**



Xn :
Zararlı



N :
Çevre
için
tehlikeli

İÇİNDEKİLER :

Epoxiconazole+ thiophanate - methyl ve diğer katkı maddeleri içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

R40: Kanserojen etki konusunda sınırlı delil.

R62: Doğurganlığı azaltma olası riski.

R63: Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski.

R68: Tedavisi mümkün olmayan etki olası riski.

R20/22: Solunursa ve yutulursa sağlığa zararlıdır.

R50/53: Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

S20/21: Kullanımı sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.

S36/37: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S60: Atığını ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin.

S61: Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına / Güvenlik bilgi formuna bakın.



KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR :

BITKİ ADI	HASTALIK ADI	KULLANMA DOZU	*PHI
Buğday	Pas (<i>Puccinia spp.</i>)	60 ml/da	35 gün
	Külleme (<i>Erysiphegraminis f.sp tritici</i>)	60 ml/da	35 gün
	Septorya Yaprak lekesi (<i>Septoria tritici</i>)	60 ml/da	35 gün

*PHI: son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

METTO ULTRA Süspansiyon Konsantre (SC) formülasyonunda iki değişik aktif madde içeren geniş etkili alanına sahip bir fungisittir.

ETKİ ŞEKLİ VE ÖZELLİKLERİ :

Sistemik özellikte, koruyucu ve tedavi edici etkiye sahip bir fungisittir. İlaçlamadan hemen sonra bitki içerisine girer ve diğer bölümlere taşınarak daha sonra yağacak olan yağmurdan etkilenmez ve iyi bir rezidüel koruma sağlar.

ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. İlacın kutu kapağı açılmadan iyice çalkalanmalı ve gerekli miktarda ilaç başka bir kaptaki bir miktar suyla iyice karıştırılarak aletin deposuna aktarılır. Aletin karışma düzeni devamlı çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.

KULLANMA ŞEKLİ :

Buğday, Buğday küllemesi ve septorya yaprak lekeli hastalıklarında ilk belirtiler görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :

METTO ULTRA adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3,G1;1,B1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle,direnç gelişimini geciktirmek için METTO ULTRA'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise,farklı etki mekanizmasına sahip (grup 3,G1;1,B1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU :

Tritosulfuron+Dicamba, Alpha-Cypermethrin terkipli ilaçlar ve demirli bileşikler ile karıştırılarak uygulanabilir. Karışımlar bekletilmeden uygulamaya geçilmelidir.



Külleme
(*Erysiphegraminis f.sp tritici*)



Pas
(*Puccinia spp.*)



Septorya Yaprak lekeli
(*Septoria tritici*)

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- Balıklara ve suda yaşayan canlılara zehirlidir
- Doğal su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını ezerek ve toprağa gömerek imha ediniz başka amaçlarla kullanmayınız.
- İlaçlamadan iyi sonuç alabilmek için ilgili önerilere mutlaka uyunuz.
- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

DEPOLAMA DURUMU :

Normal (Serin ve kuru) şartlarda kendi ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde bir değişiklik olmaz.



MANTAR İLACI

FUNGİSİT

METTO
ULTRA
SC

187 g/l Epoxiconazole + 310 g/l Thiophanate-methyl



167

