

PAIX® 2F

SÜSPANSİYON
KONSANTRE
(SC)

ETKİLİ MADDE : 240 g/l Tebufenozide
N-tert-butyl-N'-(4-ethylbenzoyl)-3,5-dimethylbenzohydrazide

GRUP 18A İNSEKTİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ : Zehirlilik seviyesi düşük olduğundan ciddi zehirlenme belirtileri göstermez. Gerek görülmesi halinde Ulusal Zehir Merkezi ile irtibata geçiniz.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ : Deri ile teması halinde, temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. İlaç göze gelmişse, göz kapaklarını açarak bol ve temiz su ile 10-15 dakika yıkayınız. İlaç solunmuş ise hastayı havadar, temiz ve sakin bir yere alınız. Yutulmuş ise ağzınızı bol su ile çalkalayınız ve su içiniz. Belirtilerin devam etmesi halinde doktora başvurunuz. İlaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ : Özel bir antidotu yoktur. Belirti ve şiddetine göre doktor tedavisi uygulayınız.,

TEDAVİ ŞEKLİ : Mideyi mide muhteviyatının solunum yollarına kaçmamasına dikkat ederek yıkayınız. Sonra semptomatik tedavi uygulayınız.

TEHLİKE ÖZELLİĞİ : Tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır.



250 cc



İÇİNDEKİLER :

Tebufenozide ve diğer katkı maddeleri içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S46: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. (Mümkünse etiketini gösterin.)



KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR :

Bitki adı	Zararlı adı	Kullanma dozu	*PHI
Bağ	Salkım güvesi (<i>Lobesia botrana spp</i>)	40 ml/100 lt su	21 gün

*PHI : Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

İLACIN HAZIRLANMASI :

Gerekli ilaç önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile sulandırılır. Bu karışım aletin yarım doldurulmuş deposuna karıştırılarak ilave edilir. Karıştırma düzeni çalışır durumdayken depo su ile tamamen doldurulur. İlaçlama sırasında salkımların iyice ıslanması için iyi bir kaplama ilaçlama yapılmalıdır. Yer aletlerine yaprak altı memeleri takılmak suretiyle, yaprak altı düzeylerinin iyice ıslanması sağlanmalıdır. İlaçlamalar rüzgarsız havalarda yapılmalıdır. İlaçlamalara her jenerasyona ait larva zararı görülünce başlanmalıdır.

PAIX 2 F salkım güvesi larvaların gömlek değiştirme sürelerini hızlandırmak suretiyle ölmelerini sağlar. İlaçlamadan çok kısa sonra (1-2 saat) zararlıların beslenmelerini durdurur ve birkaç gün içerisinde ölmelerini sağlar.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ : PAIX 2 F adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 18A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geçiktirmek için PAIX 2 F'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 18A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABULURLULİK DURUMU :

Birçok insektisit ve fungusit ile karışabilir. Bordo bulamacı gibi kuvvetli reaksiyon gösteren ilaçlarla karıştırılmaz.



Salkım güvesi
(*Lobesia botrana spp*)

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- Arılara ve balıklara zehirlidir. ilaç artıklarının akarsu, durgun su ve içme sularına bulaşmaması için gerekli tüm önlemler alınmalıdır. Çiçeklenme zamanı uygulamayınız.
- Rüzgarlı havalarda ilaçlama yapmayınız.
- İlaçlı mahlulun tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Kullanılmayan ilaç, kendi ambalajı içerisinde, ağzı sıkıca kapalı olarak, çocukların ulaşamayacağı kilitli serin ve kuru yerlerde saklanmalıdır.
- Boş ilaç ambalajlarını, başka herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.
- İlaçlama ile hasat arasındaki süreye uyunuz.

DEPOLAMA DURUMU ve DİĞER BİLGİLER : Normal (Serin ve kuru) depolama şartlarında 2 yıl depolandığı taktirde ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.



BÖCEK İLACI

İNSEKTİSİT

PAIX
2F

240 g/l Tebufenozide



67

