

P Patch®

SUSPANSİYON
KONSANTRE
(SC)

ETKİLİ MADDE : 125 g/l Flutriafol
(RS)-2,4'-difluoro--(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) benzhydryl alcohol

GRUP 3,G1 FUNGİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Düşük toksisiteli olmasına rağmen, dikkatsizce kullanılır veya kazaen yutulursa kaslarda gerilme, refleks azalması ve hareketlerde dengesizlik görülür.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ : Doktor çağırın, ilaç ambalaj ve etiketini doktora gösterin hastayı ilaçlı yerden uzaklaştırın. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarın, deriye ve göze bulaşmışsa bol su ve sabunla yıkayınız.

ANTİDOTU : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.



1 Lt



TEHLİKE
ÖZELLİĞİ :



Xn: Zararlı

İÇİNDEKİLER :

Flutriafol ve diğer katkı maddeleri içerir.

R -- UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

R22 : Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.

S---- GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

S2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.



KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR :

BİTKİ ADI	HASTALIK ADI	KULLANMA DOZU	*PHI
Şekerpancarı	Yaprak Leke Hastalığı (<i>Cercospora beticola</i>)	50 ml/da	35 gün
Buğday	Pas (<i>Puccinia spp.</i>)	100 ml/da	30 gün

*PHI: son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

İLACIN HAZIRLANMASI :

Gerekli miktardaki ilaç az bir suyla ayrı bir kaptan önce bulamaç haline getirilir. Yarısına kadar su doldurulmuş ve karıştırıcısı çalışmakta olan ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamalanır. İlaçlama yaparken yaprakların alt ve üst yüzeylerinin iyice ilaçlanmasına dikkat ediniz. İlaçlamayı sabahleyin veya akşam üzeri havanın çok sıcak olmadığı zamanlarda yapınız.

İLACIN KULLANILMASI :

Buğday da Pas : İlk hastalık belirtileri görüldüğü zaman ilaçlamaya başlanır.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :

PATCH adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3, G1 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir.

Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geçiktirmek için PATCH'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.

Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 3, G1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Lambda-cyhalothrin, Pirimicarb, Captan ve Maneb terkipli ilaçlarla karışabilir.



Yaprak Leke Hastalığı
(*Cercospora beticola*)



Pas
(*Puccinia spp.*)

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- Arılara az zehirlidir.
- Balıklara zehirlidir
- İlacı ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- İlaç ve artıklarını havuz, akarsu ve göllere bulaştırmayınız. Rüzgarla sürüklenmenin olabileceği havalarda kullanmayın. Boş ambalajları gömün.
- Depolama sırasında ilacın nemlenmesine müsaade etmeyin. Bu kimyasal değişikliğe sebep olabileceğinden ilacın fungusit etkisini azaltabilir.

DEPOLAMA DURUMU ve DİĞER BİLGİLER :

Normal (Serin ve kuru) depolama şartlarında en az iki yıl depolandığı takdirde ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.



MANTAR İLACI

FUNGİSİT



PATCH

125 g/l Flutriafol



181