

P

TOHUM İLAÇLAMASI İÇİN
AKICI KONSANTRE SIVI (FS)

Picasso® 500FS

Etkin Madde: 500 g/l Fipronil

(±)-5-amino-1-(2,6-dichloro- α , α -trifluoro-para tolyl)-4- trifluoromethylsulfinyl-pyrazole-3- carbonitrile
(IUPAC)

GRUP

2B

İNSEKTİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ : Merkezi sinir sisteminin etkilenmesi ile titreme,daha ileri dönemde uyuşukluk veya çirpınma.

İLK YARDIM VE TEDBİRLERİ : Deriye temas halinde bulaşmış giyecekleri çıkartın ve derinin bulaşmış kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayın. Göze temas halinde bol su ile 20 dakika süreyle yıkayın. Eğer yutulmuşsa hemen hekime başvurun,ambalajı ve etiketi gösterin.

ANTİDOTU VE TEDAVİ : Bilinen bir antidotu yoktur.Hastayı hekim denetiminde bulundurun.Fipronil bir geri dönüşlü GABA reseptörü inhibitörüdür. Bağırsaktan alınışı yavaştır, mide yıkama, musil ve aktif kömür ile emilme azaltılabilir. Aşırı fipronil alımından kaynaklanan çirpınma durumlarında phenobarbital'in etkili olduğu bildirilmektedir.



500 cc

**TEHLİKE
ÖZELLİĞİ :**



Xn: Zararlı

İÇİNDEKİLER :

Fipronil ve diğer katkı maddeleri içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

R22: Yutulması halinde zararlıdır.

R26: Solunması halinde çok toksiktir.

R48/25: Toksik: Yutma yolu ile uzun süre maruz kalınması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.


S13: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S28: Cilt ile temasında derhal bol ile iyice yıkayın. (Uygun sıvı üretici tarafından belirlenir.)

S36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın

S45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. (Mümkünse bu etiketi gösterin.)





BÖCEK İLACI

İNSEKTİSİT

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ : PICASSO 500 FS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için PICASSO 500 FS'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR :

| Bitki Adı | Zararlı Adı | Dozu | *PHI |
|-----------|--|--|--------|
| Mısır | Tel kurtları (<i>Agriotes spp.</i>) | 250 ml/100 kg tohum ekim öncesi tohum ilaçlaması | 56 gün |

*PHI : Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

KULLANMA ŞEKLİ :


PICASSO 500 FS nin tohum üretim birimlerinde, tohum ilaçlama makineleriyle kullanılması tavsiye edilir. Makine, verilen doza göre kalibre edilir ve ilaç sulandırmadan doğrudan kullanılır.

Çiftçi düzeyindeki uygulamalarda tohum ilaçlama bidonları ve çimento karıştırıcıları kullanılmalıdır. Önce gerekli miktar ilaç 2-3 misli su ile karıştırmalı ve aletin deposuna konulmuş tohumlar üzerine dökülerek beklemeden alet en az 3 dakika döndürülerek çalıştırılarak tohumlar düzgün pembe renk alıncaya kadar karışım sağlanmalıdır.

İlaçlanan tohumlar kurumaları için düz bir zemine yayılmalı ve 10 dakika beklenmelidir.

KARIŞILIRLILIK DURUMU :

Diğer insektisit ve fungusitlerle tank karışımı yönünden yüksek alkali özellikte olanlar dışında bir engel bulunmamaktadır. Bununla birlikte, karışım durumunda önce bir çimlenme testi yapılmalıdır.



Tel kurtları
(*Agriotes spp.*)

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- İlacı ambalajında kapalı olarak bulundurun.
- Arılara ve balıklara zehirlidir.
- Sulara bulaştırmayınız
- Fazla sıcak olmayan, serin ve kuru depolarda, muhafaza edilmelidir.
- Boş ambalajlar usulüne uygun olarak imha edilmelidir.
- İlaçlamadan sonra alet ve makineleri bol su ile yıkayın.

DEPOLAMA DURUMU ve DİĞER BİLGİLER:

Normal (Serin ve kuru) depolama şartlarında 2 yıl depolandığı taktirde ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

PICASSO
500 FS

500 g/l Fipronil

