



# SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

# Fintec®

**ETKİLİ MADDE :** 480 g/l Ethepon + 60 g/l Cyclanilide  
2-chloroethylphosphonic acid (IUPAC) 1-(2,4-dichloroanilincarboxyl)  
cyclopropanecarboxylic acid (IUPAC)

GRUP


---

DEFOLYANT

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :** Gözde ve deride tahrişe neden olabilir. Zehirlenme belirtileri Sedation ve Cyanosis'tir

**İLK YARDIM VE ANTİDOTU :** Gözlerle temas durumunda, göz kapaklarını kaldırarak açık tutun ve en az 15 dakika süre ile göze su püskürtün. Doktora götürün. Deri ile temas durumunda ilaçlı elbiseleri çıkararak bol su ve sabunla yıkayın. Giysileri ayrıca yıkayın. Yutulması halinde eğer hasta şuurlu ve uyanık ise 2-3 bardak su içirin, kusturmaya çalışmayın, doktora götürünüz. Solunum yoluyla alınması halinde hastayı temiz havaya çıkartın. Nefes alamıyorsa suni teneffüs yaptırın. Gerekirse oksijen veriniz.

**ANTİDOTU VE TEDAVİ İÇİN GEREKEN BİLGİLER :** Özel bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır. Cyanosis durumunda C vitamini ve oksijen veriniz. Hastayı güneş ışığından koruyunuz.



TEHLİKE  
ÖZELLİĞİ :



Xn :  
Zararlı



C :  
Korozif

## İÇİNDEKİLER :

Ethepon + Cyclanilide ve diğer katkı maddeleri içerir.

## UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

**R22:** Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.

**R20/21:** Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.

**R34:** Yanıklara neden olur.

**R37:** Solunum sistemini tahriş eder.

**R40:** Tedavisi mümkün olmayan etki oluşturabilir.

**R48/22: Zararlı:** Uzun süreli yutulması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.

**R52/53:** Sucul organizmalar için zararlı, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

## GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

**S1/2:** Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

**S26:** Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.

**S36/37/39:** Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.

**S45:** Kansere neden olabilir.

**S46:** Yutulması halinde hemen doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

**S61:** Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına / Güvenlik bilgi formuna bakın.



BİTKİ ADI	KULLANIM AMACI	KULLANIM DOZU VE DÖNEMİ	*PHI
Pamuk	Yaprak dökürücü	200 ml/da	7 gün

\*PHI: Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

FİNTEC, Pamuk hasadından 10-14 gün önce uygulanan ve yaprakların yeşil olarak dökülmesini sağlayan bir ilaçtır. Yapraklar tarafından alınır ve sapın gövdeye bağlandığı yerdeki ayırıcı dokunun erken olgunlaşmasını sağlayarak yaprakların henüz yeşilken dökülmelerine neden olur. Yaprak kurumadan döküldüğü için kozalardaki pamuk lifleri temiz kalır ve pamuğun bir seferde hasadına imkan sağlar. İlaç hem serin hemde sıcak hava koşullarında iyi sonuç verir.

#### KULLANMA ŞEKLİ :

İlaç su ile karıştırılarak kullanılır. Dekara 40 lt su hesabıyla tüm bitkilerde iyi bir kaplama yapacak şekilde ilaçlama yapılmalıdır. İyi sonuç alınabilmesi için bitkinin tüm yapraklarının ilaçlı mahlul ile temas etmesi sağlanmalıdır.

**Hasat :** Randımanlı bir hasat için kozaların açılma durumu yakından izlenmelidir. Uygulamadan itibaren 7 gün geçmeden hasat yapılmamalı, bir kayıba neden olmamak için de hasat çok geciktirilmemelidir. Normal koşullarda uygulamadan 14-21 gün sonrası hasat için uygundur.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bal arılarına tehlikeli değildir.
- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız
- Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız, komşu kültür bitkilerine zarar verebilir.
- İlacı ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- İlacı kullanmadan önce çalkalayınız.
- ilaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Tıkanmış memeleri ağnızla üfleterek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.
- Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

#### DEPOLAMA DURUMU VE DİĞER BİLGİLER:

Normal (Serin ve kuru) depolama şartlarında 2 yıl depolandığı takdirde ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

**Dikkat !** FİNTEC uygulamasından 30 gün içerisinde mısır, hububat, 60 gün içerisinde yaprağı yenen sebze, 120 gün içerisinde havuç, turp gibi kökü yenen sebze ekmeyiniz.

#### KARIŞABİLİRLİK:

İlaç pamukta hasat öncesi kullanıldığından, diğer ilaçlarla karıştırılmaz.



BİTKİ GELİŞİM  
DÜZENLEYİCİLER

BGD

**FINTEC**

480 g/l Ethephon + 60 g/l Cycilanilide



353

