

# P

SUDA ISLANABİLİR TOZ İLAÇ (WP)

# Placate® 80 WP

**ETKİLİ MADDE :** % 80 Fosetyl-Al  
Aluminium tris-o-ethylphosphonate (IUPAC)

GRUP


33

FUNGİSİT

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Aşırı dozda alındığında uyku hali, titreme, nefes darlığı, adefe kasılması.

**İLK YARDIM TEDBİRLERİ :** Doktor çağırın, ilaç ambalaj ve etiketini doktora gösterin hastayı ilaçlı yerden uzaklaştırın. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarın, deriye ve göze bulaşmışsa bol su ve sabunla yıkayınız. İlaç yutulmuşsa hasta kusturulmalıdır.

**ANTİDOTU :** Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.



**TEHLİKE  
ÖZELLİĞİ :**



*Xi: Tahriş edici*

**İÇİNDEKİLER :**

Fosetyl-Al + diğer katkı maddeleri içerir.

**UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :**

**R41:** Ciddi göz hasarları tehlikesi.

**GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :**

**S2:** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

**S26:** Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.

**S39:** Koruyucu gözlük / maske kullanın.

**S46:** Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

**S29/56:** Kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin.



#### KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR :

BİTKİ ADI	HASTALIK ADI	KULLANMA DOZU	*PHI
Hıyar Kavun	Yalancı mildiyö ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> )	200g/100 l su	3 gün
Turunçgiller (Limon, Portakal Greyfurt, Mandalina)	Kahverengi çürüklük Gövdede zamklanma hastalığı ( <i>Phytophthora citrophthora</i> ) Meyvede hasat sonrası kahverengi çürüklük ( <i>Phytophthora citrophthora</i> )	200g/100 l su  300g/100 l su (meyveler ilaçlı suya 3 dakika süre ile daldırılır)	14 gün
Armut	Ateş yanıklığı ( <i>Erwinia amylovora</i> )	400g/100 l su	14 gün
Soğan	Soğan mildiyösü ( <i>Perenospora destructor</i> )	150g/100 l su	14 gün
Domates	Domates Mildiyösü ( <i>Phytophthora infestans</i> )	250g/100 l su	7 gün

\* PHI : son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

**HER İLAÇLAMADAN ÖNCE AĞAÇLARDAKİ HASTALIKLI KISIMLAR DEZENFEKTANA BATIRILMIŞ BİR ALET İLE KESİLEREK UZAKLAŞTIRILIR.**

#### İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ :

İlaç su ile karıştırılarak kullanılır. Gerekli miktardaki ilaç az bir suyla ayrı bir kaptan önce bulamaç haline getirilir. Yarısına kadar su doldurulmuş ve karıştırıcısı çalışmakta olan ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır. Hazırlanmış ilaçlı mahlulü aynı gün kullanınız..

#### KULLANMA ŞEKLİ :

**Soğan Mildiyösü :** Çevrede ilk hastalık belirtileri görülünce ilaçlamaya başlanır. 10 gün ara ile ilaçlama yapılır.

**Hıyar-Kavun yalancı mildiyö :** ilaçlamaya bitkiler kol atmaya başladığında ya da çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile başlanır. 10 gün ara ile tekrarlanır. Son ilaçlama ile hasat arasında en az bir hafta süre bırakılmalıdır.

**Turunçgillerde kahverengi çürüklük :** Hızlı sürgün gelişmesinin olduğu dönemlerde (Nisan, Haziran ve Eylül'de) birer kez olmak üzere yılda 3 ilaçlama yapılır.

**Armut ateş yanıklığı :** Çiçeklenme başlangıcından itibaren (beyaz rozet) 7-8 gün aralıklarla en az 3 ilaçlama yapılmalıdır.

**Domates Mildiyö :** Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz küllü gibi konide örtüsünün görülmesi ile başlanır. Bitkinin yaprak alt yüzeylerinin ve hertarafının iyice ilaçlanması gerekir.

**DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :** PLACATE 80 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 33 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geçiktirmek için PLACATE 80 WP'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmıyınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 33 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.



Kahverengi çürüklük  
Gövdede zamklanma  
hastalığı  
(*Phytophthora citrophthora*)



Meyvede hasat sonrası  
kahverengi çürüklük  
(*Phytophthora citrophthora*)



Ateş yanıklığı  
(*Erwinia amylovora*)



Soğan mildiyösü  
(*Perenospora destructor*)

#### KARIŞABİLİRLİK DURUMU :

Yaprak gübrelere, bakırlı ilaçlar ve dicofol ile karışmaz. Yağ veya yağlı ilaçlar ilacın yapraklara nüfuzunu önlediğinde daha sonra kullanılmalıdır. İlaçlarda değişik kalitede dolgu maddeleri kullanıldığından dolayı karışım yaparken yaygın uygulamadan önce küçük çapta ön denemeler yapılması önerilir.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN

##### DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- Arılara az zehirlidir. Çiçeklenme zamanı uygulamayınız.
- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmaktan kaçınınız.
- İlaç ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Bekleme süresine uyunuz.
- Kullanılan aletleri bol su ile yıkayınız.
- Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- PLACATE 80 WP hızlı nem çekici olduğundan topaklaşmaması için hava almayacak şekilde korunmalıdır.

#### DEPOLAMA DURUMU ve DİĞER BİLGİLER :

Normal (Serin ve kuru) depolama şartlarında 2 yıl depolandığı takdirde ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.



MANTAR İLACI

FUNGİSİT

PLACATE  
80 WP

% 80 Fosetyl-Al

