



SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

Etapic® 72 SL

ETKİLİ MADDE : 720 g/l Ethephon
2-chloroethylphosphonic acid (IUPAC)


GRUP

BGD

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Kuvvetli bir asit olup deri ve gözlerde tahribat yapabilir. Solunursa akciğer ödemine, yutulursa mide ve bağırsak delinmesine neden olabilir.

İLK YARDIM VE ANTİDOTU: Gözlerle temas durumunda, göz kapaklarını kaldırarak açık tutun ve en az 15 dakika süre ile göze su püskürtün. Doktora götürün. Deri ile temas durumunda ilaçlı elbiseleri çıkararak bol su ve sabunla yıkayın. Giysileri ayrıca yıkayın. Yutulması halinde eğer hasta şuurlu ve uyanık ise 2-3 bardak su içirin, kusturmaya çalışmayın, doktora götürün. Solunum yoluyla alınması halinde hastayı temiz havaya çıkartın. Nefes alamıyorsa suni teneffüs yaptırın. Gerekirse oksijen verin.

ANTİDOTU VE TEDAVİ İÇİN GEREKEN BİLGİLER : Özel bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.



**TEHLİKE
ÖZELLİĞİ :**



Xn :
Zararlı



C :
Korozif

İÇİNDEKİLER : Ethephon ve diğer katkı maddeleri içerir

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RISK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

R20/21: Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.

R34: Yanıklara neden olur.

R52/53: Sudaki organizmalar için zararlı, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S26: Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.

S28: Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.

S36/37/39: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.

S45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. (Mümkünse bu etiketi gösterin.)

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S61: Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına / Güvenlik Bilgi Formuna bakın.



GENEL BİLGİ : Pamukta kozaların erken ve homojen bir şekilde açılmasını sağlar. Olgulaşan kozaların açılmasını ve yaprak dökümünü hızlandırır. Bunun sonucunda erken hasat, artan verim ve yüksek kalite elde edilir. En iyi sonucu almak için kozaların %35' açıldığında uygulanmalı ve açılmış kozalar %60'ı geçmemelidir. İlaç yalnız birkez uygulanır.

BİTKİ ADI	KULLANIM AMACI	KULLANIM DOZU VE DÖNEMİ	*PHI
Pamuk	Koza açtırıcı. Açtırıcı ve yaprak dökütürücü	200 ml/da	14 gün

*PHI : Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

İLACIN HAZIRLANMASI : Gerekli miktardaki ilaç az bir suyla ayrı bir kaptan önce karıştırılır. Gerekli miktarda ilaç, ayrı bir kaptan bir miktar suyla iyice karıştırılarak ön karışım haline getirilir, sonra bu ön karışım aletin deposuna boşaltılır. Yarısına kadar su doldurulmuş ve karıştırıcısı çalışmakta olan ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır. 5-6 saat içinde yağmur bekleme halinde ilaçlama ertelenmelidir. İlaçlı mahlul ile iyi kaplama temin etmek için yer aletleriyle dekara 20 ile 40 litre su kullanılmak ve ilaçlı mahlul bekletilmeden kullanılmalıdır. İlaçlama aletleri en geç 1 saat içinde iyice yıkanarak temizlenmelidir.

HASAT : İlaçta beklenen üstün sonuçların alınması için kozaların açılma durumu yakından izlenmelidir. İlacın uygulanması üzerinden 7 gün geçmeden hasat yapılmamalı ancak bir kayıba da meydan vermemek üzere hasat çok da geçiktirilmemelidir. Normal şartlarda ETAPIC 72 SL uygulamasından 2 ile 3 hafta geçtikten sonra hasat yapılması uygundur.

FİTOTOKSİSİTE DURUMU: Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında pamukta herhangi bir olumsuz etki yapmaz.

KARIŞILIRLIK: ETAPIC 72 SL sodyum klorat içerener hariç diğer birçok yaprak dökücü ile karışabilir.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Hiçbir sulama sistemiyle birlikte uygulamayın.
- İlacı ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Sulama suyuna veya günlük kullanma sularına bulaştırmayın.
- Uygulamayı izleyen 30 gün süresince bir başka bitki ekmeyin.
- Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU VE DİĞER BİLGİLER :

Normal (Serin ve kuru) depolama şartlarında 2 yıl depolandığı takdirde ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.



BİTKİ GELİŞİM
DÜZENLEYİCİLER

BGD

ETAPIC
72 SL

720 g/l Ethephon



351

