



# Organic SEEMACTIN®

EMÜLSİYON  
KONSANTRE  
(EC)

**Etkili madde :** 10 g/l Azadiractin

dimethyl [2aR-[2a,3,4(1aR\*, 2S\*, 3aS\*,6aS\*,=7S\*,7aS\*),

4a,5,7aS\*,8(E),10, 10a,10b]]-10- (acetyloxy)octahydro-3,5-dihydroxy-4-methyl-8-=[2-methyl-1-oxo-2-butenyl)oxy]- 4-(3a,6a,7,7a-tetrahydro-6a-hydro-7a-methyl - 2,7-methanofuro=[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl)-1H,7H-naphtho[1,8-bc:4,4a-c']difuran-5,10a(8H)-dicarboxylate

GRUP

18B


ORGANİK İNSEKTİSİT / AKARİSİT

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :** Baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik.

**İLK YARDIM TEDBİRLERİ :** Doktor çağırın ve ilacın etiketini gösterin. İlaç yutulmuş ise hasta kusturulmalı, deriye bulaşmış ise bol su ve sabunla yıkanmalıdır. Göze bulaşmış ise bol su ile 15 dakika yıkanmalıdır. Aşırı solunması durumunda temiz havaya çıkarın.

**Tedavi şekli :** Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ANTİDOTU:** Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.



**TEHLİKE ÖZELLİĞİ :** Tehlikeli madde olarak sınıflandırılmamıştır.

**İÇİNDEKİLER :**

Azadiractin ve diğer katkı maddeleri içerir.

**UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :**

-----

**GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :**

**S2:** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak turun.

**S46:** Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. (Mümkünse etiketini gösterin.)



#### KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ETKİ ETTİĞİ ZARARLILAR :

Kültür bitkisi	Zararlı adı	Kullanma dozu ve dönemi	*PHI
Domates	Domates Şeftali Yaprak biti ( <i>Myzus persicae</i> ) Patates yaprak biti ( <i>Macrosiphum euphorbiae</i> )	500 ml/100 lt su Ergin, nimf 500 ml/100 lt su Ergin, nimf	3 gün

\*PHI : Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

**İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :** Gerekli ilaç miktarı önce bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama aleti yarıya kadar su ile doldurularak içine bu karışım dökülür ve kalan su miktarı ilave edilerek karıştırılır.

**UYGULAMA ŞEKLİ :** Kaplama ilaçlaması yapılması gereklidir.Bitki kısımlarının homojen bir şekilde ilaçlanmasına dikkat edilmelidir. İlaçlamalar "Zirai Mücadele Teknik Talimatları"nda önerildiği şekilde yapılmalıdır.

**İlaçlama aletinin kalibrasyonu :** İlaçlamadan önce ilaçlama aletinin memeleri kontrol edilip temizlenmeli, aletin düzgün çalışması sağlanmalıdır. İlaçlamadan önce aletin uygun bir şekilde kalibre edildiğinden emin olunmalıdır. Kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler düzgünce ıslatılır. Harcanan su miktarı belirlenerek ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

**Yaprak biti(Domates) :** 20-40 adet yaprakta lupta yapılan sayımlar sonucunda bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleyle başlamak gerekir.

**Patates böceği :** Tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, zararlıların yumurta, larva ve ergini aranır. Birinci döle karşı ilaçlama yapılacaksa bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem görüldüğünde, ikinci döle karşı ilaçlama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması gerekir.

**KARIŞILIRLIK :** Bordo bulamacı hariç diğer insektisit ve fungusitlerle karışabilir.



Domates Şeftali Yaprak biti  
(*Myzus persicae*)



Patates yaprak biti  
(*Macrosiphum euphorbiae*)

**DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :** SEEMACTIN adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 18B olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SEEMACTIN'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 18B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### DEPOLAMA ŞARTLARI :

Orjinal ambalajında içinde,ağız sıkıca kapalı olarak, ışıktan uzak ve iyi havalabilen yerde muhafaza ediniz. İmal tarihinden itibaren 2 yıl süreyle saklanabilir.



BÖCEK İLACI

# İNSEKTİSİT

SEEMACTIN

10 g/l Azadiractin



97

