Platin Carbendazin® WP

SUDA ISLANABİLEN TOZ İLAÇ (WP)

GRUP | **B1;1** | **FUNGİSİT**

ETKİLİ MADDE : % 50 Carbendazim
Methyl benzimidazole-2-yl carbamate

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ : Zehirliliği yok denecek kadar az olan bu ilaç vücuda alındığında baş dönmesi, halsizlik, baş ağrısı, bulanık görme emareleri oluşturabilir.

İLKYARDIM VE ANTİDOTU : Temas halinde deriyi sabunla yıkayın ve gözleri bol su ile yıkayın. Göz ile teması halinde göz kapakları açık tutarak en az 15 dakika bol temiz su ile yıkayınız. Solunması halinde hastayı temiz havaya çıkarınız ve sakin tutunuz. Nefes almıyorsa suni teneffüs yapınız. Doktor çağırınız ve yutulması halinde derhal doktor çağırınız. İlaç amablaj ve etiketini birlikte gösteriniz. 1-2 bardak su içirerek hastayı kusturunuz. Bilinci yerinde olmayan hastaya ağızdan birşey vermeyiniz. Gözler için doktora başvurun.

ANTİDOTU : Spesifik antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.



TEHLİKE ÖZELLİĞİ :

T: Toksik

N : Çevre için tehlikeli

İÇİNDEKİLER : Carbendazim ve diğer katkı maddeleri içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :
R46: Kalıtımsal genetik hasarlara neden olabilir
R60: Üremeyi olumsuz etkileyebilir.
R61: Anne karnındaki çocuğa zarar verebilir.
R50/53: Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :
S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
S45: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. (Mümkünse bu etiketi gösterin.)
S53: Maruz kalmaktan sakının, kullanmadan önce kullanma talimatını okuyun.
S60: Atığını ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin.
S61: Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik bilgi formuna başvurun.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ : PLATIN CARBENDAZIN adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B1;1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geçiktirmek için PLATIN CARBENDAZIN'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup B1;1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİLİK DURUMU : Deltamethrin terkipli ilaçlar ile emniyetle karışabilir.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞI ZARARLILAR :

BİTKİ ADI	ZARARLI ADI	KULLANMA DOZU	*PHI
Armut	Karaleke *(Venturia pyrina)*	30 g/100 lt su	14 gün
Elma	Karaleke *Venturia inaequalis)*	30 g/100 lt su	14 gün
Ayva	Ayva Monilya *(Sclerotinia linhartiana)*	75 g/100 lt su	14 gün
Yenidünya	Karaleke *(Venturia inaequalis var.erobotryyae)*	60 g /100 lt su	14 gün
Sert Çekirdekliler	Çiçek Monilyası *(Sclerotinia laxa)*	75 g/100 lt su	14 gün
**Kabakgiller	Külleme *(Erysiphe cichoracearum, Sphearotheca fuliginea)*	50 g/100 lt suya	28 gün
Mercimek	Kök boğazı çürüklüğü *(Ascochyta pinodella)*	300 g/100 kg (tohuma)	---
Buğday	Sürme *(Tilletia foetida, Tilletia caries)*	150 g/100 kg (tohuma)	---
Çeltik	Yanıklık *(Pyricularia oryzae)*	150g/da	14 gün
Bağ	Külleme *(Uncinula necator)*	60 g/100 lt su	15 gün
Turunçgiller (Limon)	Yeşil küf çürüklüğü *(Penicillium digitatum)*	50 g/100 lt suya	21 gün
	Mavi Küf çürüklüğü *(Penicillium. italicum)*	50 g/100 lt suya (hasattan sonra daldırma)	21 gün
Şeker pancarı	Külleme *(Erysiphe polygoni)*	40 g/100 lt suya	14 gün
	Yaprak lekesi *(Cercospora beticola)*	40 g/100 lt suya	14 gün

** PHI : son ilaçlama ile hasat arasındaki süre*
*** Kabakgillerde Ege ve akdeniz bölgesinde tavsiye edilmemelidir.*

UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ : Gerekli miktardaki ilaç az bir suyla ayrı bir kapta önce bulamaç haline getirilir. Yarısına kadar su doldurulmuş ve karıştırıcısı çalışmakta olan ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır. İlaçlama yaparken yaprakların alt ve üst yüzeylerinin iyice ilaçlanmasına dikkat ediniz. İlaçlamayı sabahleyin veya akşam üzeri havanın çok sıcak olmadığı zamanlarda yapınız.

KULLANMA ŞEKLİ : PLATİN CARBENDAZİN bu etiketteki tavsiyelere göre kullanılmalıdır. Aynı sezonda sadece 1 ilaçlamaya ihtiyaç gösteren hastalıklar dışında, birden fazla ilaçlama yapılan hastalıklara karşı rezistanslığın meydana gelmesini geciktirmek veya mani olmak için, aynı ilaçlama sezonunda sadece kullanmayın.
Armut ve Elma karalekesine karşı ;
1. ilaçlama : Çiçek gözleri kabardığında
(dal sıracası bulunan yerde 3-5 gün önce)
2. ilaçlama : Beyaz rozet döneminde (armut)
Pembe rozet döneminde (elma)
3. İlaçlama : Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4. ve diğer ilaçlamalar hastalığın etki süresine ve ekolojik koşullara göre ilaçlamalara devam edilir.
Elmada külleme karaleke mücadelesi gibidir. Ancak Haziran ayının 3. haftasına kadar ilaçlamalara devam edilir.
Bağ küllemesi : 1. ilaçlama sürgünler 25-30 cm uzunlukta iken, 2. ilaçlama çiçek taç yaprakları döküldüğünde, 3. ve diğer ilaçlamalar hastalığın gelişme durumu ve hava şartları dikkate alınarak yapılmalıdır. Tanelere tatlı su yürüdüğünde ilaçlamalara son verilir.

Ayva Monilya
(Sclerotinia linhartiana)

Sürme
(Tilletia foetida, Tilletia caries)

Külleme
(Erysiphe polygoni)

Kabakgillerde Külleme : İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine göre 15 gün ara ile 2-5 ilaçlama yapılır.
Ayva Monilya : ***1.ilaçlama*** Çiçeklenme başlangıcında
2.ilaçlama Tam çiçeklenmede
Turunçgillerde Depo çürüklüğü : İlaçlamalar hasattan önce ve hasattan sonra yapılmalıdır. Hasattan 10 gün önce ilaçlama yapılırsa hasattan sonra tekrar ilaçlamaya gerek yoktur.
Çeltik yanıklık hastalığı : Yeşil aksan ilaçlamasında hastalık tarlada görülmeye başladığı zaman ilk ilaçlama,10 gün ara ile ikinci, gerekirse 3. ilaçlama yapılır.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :
- Balıklara zehirlidir. İlaç ve artıklarını havuz, akarsu ve göllere bulaştırmayınız.
- Rüzgarla sürüklenmenin olabileceği havalarda kullanmayın.
- İlacı ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boş ambalajları usulüne uygun imha ediniz.
- Depolama sırasında ilacın nemlenmesine müsade etmeyin.
- Bu kimyasal değişikliğe sebep olabileceğinden ilacın fungisit etkisini azaltabilir.
- Ateş ve kıvılcımdan uzak tutunuz.

FİTOTOKSİSİTESİ : PLATIN CARBENDAZIN tavsiye edilen dozlarda, tavsiye edilen bitkilere fitotoksik değildir.

DEPOLAMA DURUMU ve DİĞER BİLGİLER : Normal (Serin ve kuru) depolama şartlarında 2 yıl depolandığı taktirde ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz. PLATİN CARBENDAZİN'i 50ºC'nin üzerinde veya doğrudan güneş ışığına maruz kalabileceği yerlerde depolamayınız.

MANTAR İLACI

FUNGİSİT

PLATIN CARBENDAZIN
WP

% 50 Carbendazim