

P Perplex®

SUDA
ÇÖZÜNÜR
TABLET

ETKİLİ MADDE : 1 tablet 1gr Saf Gibberellic acid (GA3).
2,4a,7-trihydroxy-1-methyl-8-methylenegibb-3-ene-1,10-dicarboxylic acid 1,4a-lactone

GRUP

BGD

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ : Zehirli değildir. Hiç bir belirti göstermez

İLK YARDIM TEDBİRLERİ : Yutulmuşsa, kusturulmaz. Göze bulaşmışsa bol su çarpılır. Bulaşık vücut kısımları bol su ve sabunla yıkanır.

ANTİDOTU : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.



**TEHLİKE
ÖZELLİĞİ :**



Xi: Tahriş edici

İÇİNDEKİLER :

Gibberellic acid ve diğer katkı maddeleri içerir

UYGULAYICI VE CEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :


R36: Gözleri tahriş eder.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S26: Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.



KULLANILDIĞI BİTKİ VE KULLANIM AMACI :

BİTKİ ADI	KULLANMA AMACI VE DÖNEMİ	DOZU/100 lt suya
Çekirdesiz Üzümler	İri salkım ve iri daneli elde etmek için "PERPLEX" Birinci uygulama çiçek kapsüllerinin % 70 döküldüğü devrede, ikinci uygulama ise bundan 10-12 gün sonra, tanelerin 3 mm çapında saçma iriliğine ulaştığında yapılır.	2 tablet
Kurutmalık Üzümlerde	Çiçek kapsüllerinin dökülmesinden 4-5 gün sonra uygulama yapılır.	1/2 tablet
Narenciyelerde	1. Çiçek döllemesini teşvik için. Özellikle Satsuma ve Klematin türü mandalinalarda çiçeklerin % 75-80'i açtığı devrede hazırlanan solüsyon çiçeklere püskürtülür. 2. Haziran dökümü önlemek için Valensiya portakalları hariç açımının tamamlanmasından 4-5 hafta sonra (döküm başlamadan önce hazırlanan solüsyon çiçeklere püskürtülür.) 3. Hasadın geciktirilmesi için; a)Vaşington portakallarda meyvelerde ilk renk değişimi görülür/görülmez hazırlanan solüsyon meyvelere püskürtülür. b)Yataklık limonlarda, meyvelerde ilk renk değişimi görülür/görülmez hazırlanan solüsyon meyvelere püskürtülür. Böylece meyvelerin 2-3 ay müddetle ağaç üzerinde kalmaları sağlanır. c)Greyfurtlarda ilk renk dönüşümü görüldüğünde hazırlanan solüsyon meyvelere püskürtülür.	1.5 tablet 2 tablet 1 tablet 1.5 tablet
Armut	Meyve tutumu az olan armut çeşitlerinde çiçeklerin % 30'u açtığı verim artırmak için ve çiçeklenme devresinde meydana gelebilecek don zararından korunmak için donlardan en geç 2 gün sonra hazırlanan solüsyon ağaçlara püskürtülür.	1.5-2.5 tablet
Kiraz ve Vişne	Meyvelerde renk değişiminin başladığı dönemde uygulanır. (İri dayanıklı ve düzgün meyve elde etmek için)	1.5-2 tablet
Şeftali	Özellikle Dixired ve Hale çeşitlerinde Ağustos'un ilk haftası içinde hazırlanan solüsyon püskürtülür. Bu uygulama Ağaçları İlkbahardaki geç donlardan koruyacağı gibi meyve Seyretme işide kendiliğinden halledilmiş olacaktır.	10-15 tablet
Çilek	Mahsule yatmayı sağlamak ve iri meyve elde etmek için kullanılır. Çiçeklenmeden 3-4 hafta önce hazırlanan solüsyon sırt pompası ile püskürtülür.	1.5 - 2.5 tablet
Enginar	Turfanda enginar yetiştirmek, ve yüksek verim almak için Enginarların 4-5 yaprak, yaprak boylarının 25-30 cm olduğu devrede, özellikle bitkilerin göbek kısımlarını pülverize edilir. Normalde fazla gübre verilmeli ve zamanında sulanmalıdır.	2.5 - 5 tablet
Patates	Tohumluk olarak kullanılacak patatesler, dikimden önce hazırlanan solüsyona dikimden önce daldırılarak muamele edilir ve dikilir . Böylece çimlenme hızlanır ve düzenli çıkış olur.	1/2 - 1 tablet
Marul	Göbek bağlamayı teşvik için hasattan 7-15 gün önce uygulama yapılır. Soğuk hava şartlarında yüksek doz uygulanır.	1-2 tablet
Biber	Verimi arttırmak için ,çiçeklerin yarısı meyve tuttuğunda hazırlanan solüsyonla ilk uygulama bundan 2-3 hafta sonrada ikinci uygulama yapılır.	3 tablet
Süs bitkileri	Kesme çiçekçilikte uzun sap ve iri çiçek elde etmek için (karanfil, Gül, Siklamen, Krizantem)	4-15 tablet

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

Gerekli miktardaki PERPLEX önce 100 cc'den daha az olmayan su içerisinde eritilir. Bu eriyik ihtiyaç duyulan suya ilave edilir ve karıştırılır.

KARIŞILIRLIK DURUMU :

Alkali özelliktekiler ve klor içeren solüsyonlar hariç diğer fungusit, insektisit ve yaprak gübrelereyle karıştırılarak kullanılabilir.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

Önerilen dozlar dikkate alınarak hazırlanan solüsyonun bitkiye yapışmasını sağlamak için bir yayıcı-yapıştırıcı ile karıştırılarak püskürtülmesi tavsiye edilir. Tavsiye edilen dozlarda kullanıldığında fitotoksik değildir.

DEPOLAMA DURUMU :

Normal (serin ve kuru) yerde muhafaza edildiğinde ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde 2 yıl hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**BİTKİ GELİŞİM DÜZENLEYİCİLER****B G D****PERPLEX**

Gibberellic acid 1g / tablet



355