



TOHUM İLAÇLAMASI İÇİN AKICI KONSANTRE (FS)

Coacho®600 FS

ETKİLİ MADDE : 600 g/l Imidacloprid
1-(6-chloro-3-pyridylmethyl) -N- nitroimidazolidin -2- ylideneamine

GRUP


4

İNSEKTİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Hissizlik, nefes almada güçlük, titreme, kaslarda kramp.

İLK YARDIM VE ANTİDOTU: Yutulması halinde doktor çağırınız, ilaç etiketini birlikte götürünüz. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız. Deriye temas halinde bol su ve sabunlu suyla yıkayınız. Göze temas etmesi durumunda bol suyla 15 dakika süre ile yıkayınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİ İÇİN GEREKEN BİLGİLER : ANTİDOTU : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.



TEHLİKE ÖZELLİĞİ :



Xn :
Zararlı



N :
Çevre için tehlikeli

İÇİNDEKİLER :

Imidacloprid ve diğer katkı maddeleri içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

R22: Yutulması halinde zararlıdır.

R50/53: Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak durun.

S46: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun.

(Mümkünse etiketini gösterin.)

S61: Çevreye salıverilmesinden kaçınınız. Özel kullanım talimatına/ Güvenlik bilgi formuna başvurun.



KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR :

BİTKİ ADI	ZARARLI ADI	KULLANMA DOZU	*PHI
Şeker Pancarı	Tel kurtlar (<i>Agriotes spp.</i>) Kırkayaklar (<i>Diplopoda</i>) Yaykuyruklular (<i>Collembola</i>) Toprak pire böcekleri (<i>Chaetocnema spp.</i>)	1500 ml/100 kg tohum	---
Mısır	Tel kurtlar (<i>Agriotes spp.</i>)	600 ml/100 kg tohum	---
Patates	Tel kurtlar (<i>Agriotes spp.</i>)	35 ml/100 kg tohum, larva	---

*PHI : Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

Şeker pancarı : Şeker pancar tohumlarının rutubete olan duyarlılığı nedeni ile hassas bir ilaçlama yapabilmek için profesyonel ilaçlama düzenleri olan tohum işleme ve ilaçlama fabrikalarında uygulanacak ilaç karışımı hacmi, ekipman tipine, karışımına giren diğer maddelere ve kurutma imkanlarına bağlıdır. Bu nedenle mevcut tohum ilaçlama ekipmanı talimatına uyunuz.

Mısır : 100 kg tohum için önerilen miktar ilaç 1 litre suya ilave edilir ve iyice karıştırılır. Tohumluk, düz bir zemine naylon üzerine yayılır.İlaçlı karışımın yarısı tohuma püskürtülür ve tohum iyice karıştırılır sonra ilacın kalan yarısı tohuma eklenerek tohum iyice karıştırılır. İlaçlama varilleri veya bidonları içinde de aynı şekilde yapılabilir. Daha sonra tohumlar bir süre yayılarak nem oranı düşürülür ve hemen ekilir veya ekim zamanına kadar depolanabilir. Rutubetli olarak depolanırsa rutubet nedeni ile sürme gücü düşer.

Patates : Tohumluk patatesler düz bir zemin üzerine yayılır.100 kg tohumluk için önerilen ilaç miktarı bir kova içerisindeki 1-1,5 litre suya ilave edilip iyice karıştırılarak pulverizatöre aktarılır. Hazırlanan karışım patateslerin üzerine önce yarısı püskürtülerek patatesler kürekle ters yüz edilir. Sonra ilacın kalan yarısı püskürtülerek ilaçlama tamamlanır. İlaçlamada dikkat edilecek husus su miktarının tohumluğu ıslatacak fakat akmayacak miktarda olmasıdır. İlaçlamadan hemen sonra ekim yapılacağı gibi tohumlukların nemi kurduktan sonra çuvallanarak veya dökme olarak birkaç gün beklenebilir. İlaçlama, çuvallama ve dikim sırasında lastik eldiven giyilmelidir.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :

COACHO FS 600 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 4 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları,direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geçiktirmek için COACHO FS 600'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 4 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİLİK DURUMU :

Thiram ve Hymexazol terkipli ilaçlarla karıştırılabilir.



Kırkayaklar
(*Diplopoda*)



Yay kuyruklular
(*Collembola*)



Toprak pire böcekleri
(*Chaetocnema spp.*)



Tel kurtlar
(*Agriotes spp.*)


KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- İlaçlı tohumları gıda ve yem olarak kullanmayınız.
- İlaç ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- İlaç ve artıklarını havuz, akarsu ve göllere bulaştırmayınız.
- Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU ve DİĞER BİLGİLER :

Normal (Serin ve kuru) depolama şartlarında 2 yıl depolandığı takdirde ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.



BÖCEK İLACI

İNSEKTİSİT

COACHO
600 FS

600 g/11midadoprid



27