Trio TR®

SUDA DAĞILABİLEN GRANÜL (WG)

ETKİLİ MADDE : % 55 metiram + %5 pyraclostrobin
Zinc ammoniate ethylenebis(dithiocarbamate)-poly (ethylenethiuramdisulfide+ Methyl N-(((1-(4-chlorophenyl) pyrazol-3-yl)oxy)-o-tolyl)-N-methoxycarbamate

GRUP | **M3;11,C3M** | **FUNGİSİT**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ : Baş ağrısı, miğde bulantısı; halsizlik

İLKYARDIM TEDBİRLERİ : Vucuda bulaşmışsa, bulaşık elbiseler derhal çıkarılmalı, temas eden vucut kısımları bol su ve sabunla yıkanmalıdır. İlaç yutulmuşsa ağız hemen yıkanmalı ve bol su içirilmelidir.Doktor çağrılmalı, ilacın etiketi gösterilmelidir.

ANTİDOTU : Özel bir antidotu yoktur.

TEHLİKE ÖZELLİĞİ :

Xi : Tahriş edici

N : Çevre için tehlikeli

İÇİNDEKİLER : Metriram + Pyraclostrobin ve diğer katkı maddeleri içerir.

UYGULAYICI VE CEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :
R38: Cildi tahriş eder.
R50/53: Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :
S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
S24: Cilt ile temasından sakının
S37: Uygun eldiven giyin.
S46: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. (Mümkünse etiketini gösterin)
S61: Çevreye salıverilmesinden kaçının.Özel kullanım talimatına / Güvenlik bilgi formuna başvurun.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :
TRİO TR adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M3;11,C3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları,direnç gelişimini teşvik etmektedir.Bu nedenle,direnç gelişimini geçiktirmek için TRİO TR'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup M3;11,C3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU :
Eğer bir karışım yapılacaksa, ayrı bir kapta ön karışım denemesi yapılmalıdır. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR :

Bitki Adı	Hastalık adı	Kullanma dozu	*PHI
Bağ	Mildiyö *(Plasmopara viticola)* Külleme *(Uncinula necator)* Ölü kol *(Phomopsis viticola)*	200 g/100 l su 200 g/100 l su 150 g/100 l su	28 gün 28 gün 28 gün
Hıyar (Serada)	Mildiyö *(P.peronostora cubensis)*	250 g/100 l su	7 gün
Domates (Serada)	Mildiyö *(P.peronostora cubensis)*	200 g/100 l su	3 gün
Karpuz (Örtü altı)	Erken yaprak yanıklığı *(Alternaria cucumerina)*	200 g/da	7 gün

**PHI : Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre*

ETKİ ŞEKLİ VE ÖZELLİKLERİ :
Hem değme (kontakt) hemde lokal-sistemik etkili bir fungisittir. İki farklı etki şekline sahip etkin maddeler nedeniyle , hem direnç yönetimi hemde IPM'e uygundur. Iyi bir kalıcı etkisi vardır. TRİO TR spor çimlenmesini engellemede çok etkilidir, koruyucu olarak ve aynı zamanda hastalık gelişiminin erken döneminde kullanılmalıdır. Hastalıkların, ilaçlara aşı direnç oluşumunu engellemek için TRİO TR'i farklı etki şekline sahip ilaçlarla dönüşümlü olarak kullanınız.

UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :
Önerilen dozda ilaç, ayrı bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılıp, yarıya kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir ve depo suyla tamamlanır.

KULLANIM ZAMANI VE ŞEKLİ :
Bağ : Mildiyö ; İlk ilaçlama , sürgünler 25-30 cm boya erişince koruyucu olarak yapılmalı, 2. ve 3. Ilaçlamalar 14 günlük aralıklarla yapılmalı. 4. ve 5. Ilaçlamalarda ekolojik koşullar ve hastalığın seyrine göre 14 gün aralıklarla devam edilmelidir.
Külleme ; 1. Ilaçlama, sürgünler 5-30 cm boya erişince; 2. Ilaçlama , koruklar saçma tanesi iriliini alınca yapılır. 3.ilaçlama ve diğer ilaçlamalar ekoljik koşullara ve hastalığın seyrine göre 14 gün arayla danelere tatlı su yürüdüğü (ben düşme) zamana kadar devam edilir.
Ölü kol ; İlk ilaçlama, sürgünler 2-3 cm iken, 2.ilaçlama 8-10 cm ve 3. ilaçlama sürgünler 25-30cm olduğunda yapılır.

Hıyar da mildiyö ; Bitkiler kol atmaya başladığında , en geç ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalıdır. Hastalık şiddetine ve iklim koşullarına göre ilaçlamalara 7-10 gün aralıklarla devam edilir.Hastalık yoğunluğu fazlaysa kısa aralıklarla uygulanması tavsiye edilir.

Domates ve karpuz : Hastalık şiddetine ve iklim koşullarına göre ilaçlamalara 7-10 gün aralıklala devam edilir

Mildiyö
(Plasmopara viticola)

Ölü kol
(Phomopsis viticola)

Mildiyö
(P.peronostora cubensis)

Erken yaprak yanıklığı
(Alternaria cucumerina)

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :
- Aquatik organizmalara ve balıklara çok zehirlidir.
- Arılara zehirlidir.
- Doğal su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını başka amaçlarla kullanmayınız.
- Usulune uygun olarak imha ediniz
- Ilaçlamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.

DEPOLAMA DURUMU :
Orjinal ambalajlarında satılmak kaydıyla ürünün kalitesi firmamızın garantisi altındadır. Fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, depolama, dozaj ve uygulama hatalarından dolayı çıkabilecek zaarlar için sorumluluk kabul edilmez.