

P

SOLUSYON (SL)

Perplex® 20SL

ETKİLİ MADDE: 20 g/l Gibberellic acid (GA3).
(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-methyl-6-methylene-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b, 3-propeno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid


GRUP

BGD

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ : Zehirli değildir. Hiç bir belirti göstermez.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ : Doktor çağırınız, ilaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz. Hastayı ilaçlı yerden uzaklaştırın. İlaç ile bulaşmış elbiseleri çıkarın. Deriye bulaşmış ise bol su ve sabunla yıkayın. Göze bulaşması halinde asgari 15 dakika temiz su ile gözler, yıkayın. Hastayı başı yana dönük olarak yatırın ve sıcak tutun.

ANTİDOTU : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.



TEHLİKE
ÖZELLİĞİ :



Xn: Zararlı

İÇİNDEKİLER :

Gibberellic acid + diğer katkı maddeleri içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R10: Alevlenebilir.

R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.

R41: Ciddi göz hasarları tehlikesi.

R67: Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S7/9: Kabı iyice kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin.

S26: Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.

S37/39: Çalışırken uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.



BİTKİ ADI	KULLANMA AMACI VE DÖNEMİ	DOZU/100 lt suya
Sofralıklarda Çekirdeksiz üzümelerde	1.Uygulama: Çiçeklenmeden önce, salkımların çekirdeksiz 4-8 cm iken salkımların boyunu uzatmak için kullanılır.	100 ml
	2. Uygulama: Tam çiçeklenme döneminde yani çiçek taç yapraklarının %70-80'inin döküldüğü devrede dane seyreltmek için kullanılır.	100 ml
	3.Uygulama: Çiçeklenmeden sonra daneler 3 mm saçma iriliğine ulaştığında dane irileştirmek için kullanılır.	100 ml
Kurutmalık çekirdeksiz Üzümlerde	Çiçek kapsüllerinin dökülmesinden 4-5 gün sonra verimi hasadı öne almak için kullanılır.	50 ml
Mandarinler	Satsuma ve klematin çeşitlerinde Çiçek dökümünü azaltmak, meyve tutumunu ve verim artışı sağlamak amacı ile çiçeklerin %75-80'inin açtığı devrede kullanılır.	7 ml
Portakal	Yafa portakallarında Haziran dökümünü önlemek için çiçek açımının tamamlanmasından 4-5 hafta sonra kullanılır. Washington Navel'de meyvelerin ağaçta kalma süresini uzatmak ve hasadı düzenlemek için meyvelerde renk değişiminin başladığı devrede.	100 ml
Limon	Meyvelerde ilk renk değişimi görüldüğünde, meyvelerin ağaçta 2-3 ay kalmalarını sağlamak için kullanılır.	50 ml
Greyfurt	Meyve kabuğunda çürüme, bozulma ve yumuşama olmadan hasadı geçiktirmek için meyvelerde renk değişiminin görüldüğü devrede kullanılır.	50 ml
Armut	Meyve tutumu az olan çeşitlerinde çiçeklerin %30'unun %30'u açtığı devrede verimi artırmak için kullanılır.	75-100 ml
	Çiçeklenme zamanında meydana gelen don olaylarında sonra Partenokarp meyve oluşumunu sağlamak için kullanılır.	25-100 ml
Kiraz, Vişne ve şeftali	Hasadı geciktirmek ve parlak daneler elde etmek amacı ile Şeftali renk değişiminin başladığı dönemde kullanılır.	75 ml
	Ağustos ayının ilk haftasında yapılacak bir uygulama, bir sonraki yılın çiçek açımını 3-7 gün geçiktirir ve şeftalilerin ilkbaharın geç donlarından zarar görmesini önler.	75 ml
Çilek	Fideliklerde anaç bitkinin verdiği genç sürgünlerin çoğaltılması için anaç bitki 1-6 yapraklı iken mahsule yatmasını sağlamak için kullanılır. Meyveleri irileştirmek ve verimi artırmak için ise çiçeklemeden 3-4 hafta önce kullanılır.	125-150 ml
Enginar	Hasadı 1-2 ay öne almak, düzgün şekilli ve iri baş elde etmek amacı ile bitkilerin 4-5 yapraklı ve yaprak boylarının 20-230 cm olduğu devrede özellikle bitkilerin göbek kısmına kullanılır.	125-150 ml
Patates	Tohumluk patatesler, dikimden önce PERPLEX 20 SL ile hazırlanan solüsyona daldırılır ve dikilir. Böylece hızlı ve düzenli çıkış sağlanır.	25-50 ml
Marul	Göbek bağlamayı teşvik için hasattan 7-15 gün önce kullanılır.	50-100 ml
Biber	Verimi arttırmak için çiçeklerin yarısı meyve tuttuğunda ve bundan 2-3 hafta sonra kullanılır	150 ml
Süs Bitkileri	Kesme çiçekçilikte uzun sap ve iri çiçek elde etmek için (karanfil, Gül, Siklamen, Krizantem)	200-750 ml

PERPLEX 20 SL bunların dışında muz, karpuz, lahana, karnabahar, bezelye, fasulye, soya, patlıcan, maydanoz, kuşkonmaz, havuç, çay, buğday ve yonca gibi birçok bitkide de uygulanabilir.

İLACIN UYGULAMAYA

HAZIRLANMASI :

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen miktardaki ilaç ayrı bir temiz kaptaki birkaç litre su ile karıştırılır. Daha sonra aletin karıştırıcısı çalışır durumda iken hazırlanan ilaç aletin deposuna boşaltılır. Karıştırıcısı çalıştırılmaya devam edilerek gerekli su miktarı depoya ilave edilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Solüsyon Alkali özellikte ve serbest klor içeren solüsyonlar hariç diğer fungisit, insektisit ve yaprak gübrelereyle karıştırılarak kullanılabilir. Ancak yinede uygulamadan önce küçük miktarlarla ön karışım hazırlanarak deneme yapılması tavsiye edilir. Diğer ilaçlarla kullanılacaksa PERPLEX 20SL ilaçlardan ayrı olarak hazırlanmalıdır.



BİTKİ GELİŞİM
DÜZENLEYİCİLER

B
G
D



PERPLEX
20 SL

Gibberellic acid 20 g / l

