

C Süspansiyon Konsantre (SC) Comrasol Oil[®] SC 708


ETKİLİ MADDE : 4 g/L Imidacloprid + 704 g/L Mineral yağ
1-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl] =4,5 dihydro-N-nitro-1H-imidazol-2=amine

GRUP 4A İNSEKTİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ : Hissizlik durumu, kasılma, nefes almada güçlük, titreme, kramp.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ : Hastayı ilaçlı sahadan uzaklaştırınız. baygınlık riski varsa, hastayı yatay pozisyonda tutunuz. İlaçla bulaşık giysileri hemen çıkartınız. İlaç solunumu alınmışsa, hastayı temiz havaya çıkarınız. Deriyle teması halinde, bol su ve sabunla yıkayınız. Gözle teması halinde gözü suyla iyice yıkayınız. Yutulması halinde hastayı kusturmayınız, ağzı suyla ile yıkayınız. Hemen doktora gidiniz, ilaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

ANTİDÖT : Bilinen bir antidotu yoktur. Zehirlenme haline semptomatik tedavi uygulanır.



TEHLİKE
ÖZELLİĞİ :



Xn :
Zararlı



N :
Çevre
için
tehlikeli



İÇİNDEKİLER :

Imidacloprid + Mineral yağ ve diğer katkı maddeleri içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI:

R22: Yutulması halinde zararlıdır.

R50/53: Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak turun

S46: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. (Mümkünse etiketini gösterin)

S61: Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/ Güvenlik bilgi formuna başvurun



KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR :

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	*PHI
Şeftali	Dut kabuklu biti (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	2,5 litre/ 100 lt su Ergin	90 gün
Elma	San jose kabuklubiti (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	2,5 litre/ 100 lt su Ergin	90 gün
Zeytin	Zeytin kara koşnili (<i>Saissetia oleae</i>)	1,5 litre/ 100 lt su Larva-Ergin	28 gün

*PHI : Son İlaçlama İle Hasat Arasındaki Süre

UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :

Gerekli miktardaki ilaç az bir suyla ayrı bir kapta önce karıştırılır. Yarısına kadar su doldurulmuş ve karıştırıcısı çalışmakta olan ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır. Hazırlanan bu karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.

UYGULAMA ZAMANI :

Şeftali, Elma : Çiçeklerin açılmasından 2-3 hafta önce uygulanmalıdır. Ancak gerekli hallerde tomurcukların açılmasından birkaç gün öncesine (pembe tomurcuk) kadar ilaçlama yapılabilir.

Zeytin : Zeytin Kara Koşnili için kış mücadelesi şeklinde ilaçlama yapılmalıdır. Kış mücadelesi ergin oranının %10'dan az olduğu bahçelerde hasattan sonra aralık-şubat aylarında don olasılığı olmayan günlerde tek uygulama şeklindedir. İlaçlama sırasında ağaçlar uyanmamış olmalı, hava sıcaklığı 4-14°C arasında olmalıdır.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :


COMRASOR OIL SC 708 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 4A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geçiktirmek için COMRASOR OIL SC 708'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 4A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK :

Uygulandığı dönemde diğer ilaçlar ile karıştırılmasına gerek yoktur.



Dut kabuklu biti
(*Pseudaulacaspis pentagona*)



San jose kabuklubiti
(*Quadraspidiotus perniciosus*)



Zeytin kara koşnili
(*Saissetia oleae*)


KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, akarsulara bulaştırmayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

DİKKAT! : Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

DEPOLAMA DURUMU :

Serin ve kuru sıcaklığı 35°C'yi geçmeyen depo şartlarında ve orijinal ambalajında muhafaza edildiği takdirde tesirliliğini 2 yıl korur.



BÖCEK İLACI

İNSEKTİSİT

COMRASOL
OİL

SC 708

600 g/1 l İmidacloprid



29