



SUDA ISLANABİLİR TOZ (WP)

Efsane[®] 70 WP

ETKİLİ MADDE : % 70 Metribuzin
4-amino-6-(1,1-dimethylethyl) - 3 - (methylthio) -1,2,4= triazin-5(4H)-one

GRUP | C1,5 | HERBİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ : Özel bir etki şekli yoktur. Düşük toksisiteli olduğu için sadece yıkanmayan gözlerde hafif tahriş gözlenebilir.

İLK YARDIM VE ÖNELMLERİ : Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alın. Doktor çağır, ilaç ambalaj ve etiketini birlikte götür. Hastayı ilaçlı alandan uzaklaştır ve gerekiyorsa suni teneffüs yaptırın. İlaçla bulaşık giysilerini değiştirin. İlaçla bulaşan vücut kısımlarını bol su ve sabunla yıkayınız. İlaç yutulmuş ise mide muhteviyatını solunum yollarına kaçmamasına özen göstererek mideyi yıkayınız. Sonra belirtilere göre tedavi uygulayınız.

ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.



500 gr

**TEHLİKE
ÖZELLİĞİ :**



Xn :
Zararlı



N :
Çevre
için
tehlikeli

İÇİNDEKİLER : Metribuzin ve diğer katkı maddeleri.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

R22: Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.

R 50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun

S36/37: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S61: Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına / Güvenlik bilgi formuna başvurun.



KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR :

BİTKİ ADI	YABANCI OT ADI	KULLANMA DOZU	*PHI
Patates	Hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Sarmaşık Çoban değneği (<i>Polygonum convolvulus</i>) Senelik köpek lahanası (<i>Mercurialis annua</i>) irken)	50 - 75 g/da	42 gün
Domates	Kirpi darı (<i>Setaria spp</i>) Çatal otu (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Semiz otu (<i>Portulaca oleracea</i>) Horoz ibiği (<i>Amaranthus spp</i>) Kazayağı (Sirken) (<i>Chenopodium album</i>) Demir diken (Tribulus terrestris)	50 - 75 g/da Dikim sonrası	42 gün
Soya	(<i>Portulaca oleracea</i>) Horoz ibiği (<i>Amaranthus albus</i>) Hanım döşeği (<i>Euphorbia prostrata</i>) Kaz ayağı (Sirken) (<i>Chenopodium album</i>) Yabani turpu Raphanus raphanistrum)	50 - 75 g/da (ekimden hemen sonra) Çıkış öncesi	42 gün

*PHI : Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre

KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ:

Patates'te Çıkış öncesi : Patatesler çıkmadan önce toprak yüzeyine uygulanır.

Patates'te çıkış sonrası : Patatesler 10-15 cm boyda iken yabancıotlar 2-6 yapraklı iken.

Domates'te uygulama : Fideler şaşırtıldıktan birkaç gün sonra fideler ortalama uyum sağladıktan ve yabancı otların çoğu çıkınca 50 -75 g/da atılır.

Soya : Ekimden hemen sonra uygulanır başka bir işlem gerekmez

İLACIN HAZIRLANMASI :

Gerekli miktardaki ilaç önce bir miktar su ile çözdükten sonra yarı yarıya su ile dolu ilaçlama tankının içine ilave ediniz ve tankı gerekli miktarda su ile doldurunuz, karıştırıldıktan sonra uygulama yapılır. Tatbikat süresince sürekli karıştırma ilacın düzgün dağılımı ve tatbikat için gereklidir.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :

EFSANE 70 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C1,5 olarak sınıflandırılmış bir herbistir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için; EFSANE 70 WP'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup C1,5 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.



Hardal
(*Sinapis arvensis*)



Çatal Otu
(*Digitaria sanguinalis*)



Hanım döşeği
(*Alisma plantago*)

KARIŞABİLİRLİK :

Trifluralin ve 2,4-D acid, Dimethyl amin terkipli ilaçlarla karıştırılabilir. Yüksek derecede asit ve bazik ilaçlarla karıştırılmaz.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- Arılara zehirsizdir.
- Balıklara az zehirlidir ve onlara zarar vermemek için istenmeyen ilacı sulara bulaştırmayınız.
- İlacı gübre, insektisit, fungusit ve tohumlardan ayrı yerde depolamayınız.
- Akarsulara bulaştırmayınız.
- İlaç ile temastan kaçınınız. bulaşık giysilerinizi değiştiriniz
- Uygulama sırasında ilacın tavsiye edilmediği bitkilere ve meyve ağaçlarının köklerine bulaşmasına mani olunuz.
- Depolama ve ilaç artıklarının imhası sırasında sulara bulaştırmayınız.
- Gıda ve hayvan yemine bulaştırmayınız.
- Boş ambalajları ve ilaç artıklarını gömün yada usulüne uygun imha ediniz.
- Depo sıcaklığı 35°C'yi geçmemelidir.

DEPOLAMA DURUMU :

Normal (Serin ve kuru) depolama şartlarında 2 yıl depolandığı taktirde ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.



YABANCI
OT İLACI

HERBISIT

EFSANE
70 WP

% 70 Metribuzin



267