

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

# Jetanal Com®

**ETKİLİ MADDE :** 129 g/l Phenmedipham + 34 G/L Desmedipham  
Methyl 3-(3-methylcarbaniloxyloxy) carbanilate + Ethyl 3'-phenylcarbamoyloxy carbanilate

GRUP


C1,5

HERBİSİT

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ :** Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik ve bulanık görmeye neden olur.

**İLK YARDIM TEDBİRLERİ :** Doktor çağırınız. İlaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz. Hastanın ilaçla temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. İlaçlı elbiseleri değiştiriniz. Göze sıçramışsa, bol su ile yıkayınız.

**ANTİDOTU ve Tedavisi :** Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.



5 lt

1 lt

TEHLİKE  
ÖZELLİĞİ :



Xn :  
Zararlı



N :  
Çevre  
için  
tehlikeli

## İÇİNDEKİLER :

Phenmedipham + Desmedipham ve diğer yardımcı maddeler içerir.

## UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

**R10:** Alevlenebilir.

**R20/21:** Solunması ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.

**R50/53:** Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

## GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

**S2:** Çocukların ulaşabileceği yerden uzak tutun.

**S29:** Kanalizasyona boşaltmayın.

**36/37/39:** Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.

**S46:** Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

**S60:** Atığını ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin.

**S61:** Çevreye saliverilmesinden kaçınınız. Özel kullanım talimatına / Güvenlik bilgi formuna başvurun.



JETANAL COM, şeker pancarında sorun olan yıllık geniş yapraklı otlara karşı çıkış sonrasında kullanılan selektif bir ot ilacıdır.

#### KONTROL ETTİĞİ YABANCİOTLAR :

Mücadelesi 4 yapraklı döneme kadar yapılan otlar	Mücadelesi 2 yapraklı döneme kadar yapılan otlar
Hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> )	Fare kulağı ( <i>Anagallis sp.</i> )
Akça çiçeği ( <i>Thlaspi arvensis</i> )	Yabani menekşe ( <i>Viola arvensis</i> )
Çoban çantası ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> )	Çoban değneği ( <i>Polygonum spp.</i> )
Kara pazı ( <i>Atriplex spp.</i> )	Sarmaşık çoban değneği ( <i>Polygonum convolvulus</i> )
Ballıbaba ( <i>Lamium spp.</i> )	Isırğan otu ( <i>Urtica urens</i> )
Diş otu ( <i>Galeopsis arvense</i> )	Yavşan otu ( <i>Veronica spp.</i> )
Serçe dili ( <i>Stellaria media</i> )	Eşek marulu ( <i>Sonchus sp.</i> )
Kazayağı ( <i>Chenopodium album</i> )	Köpek üzümü ( <i>Solanum nigrum</i> )
Gelincik ( <i>Papaver rhoeas</i> )	Yabani krizantem ( <i>Chrysanthemum sp.</i> )
	Şahtere ( <i>Fumaria sp.</i> )
	Kişniş otu ( <i>Spergula sp.</i> )
	Tatula ( <i>Datura stramonium</i> )
	Unutma benisi ( <i>Myosotis arvensis</i> )

#### KULLANIM DOZU :

Bitki	Kullanım Dozu	Bekleme süresi
Şeker pancarı 2-4 yapraklı dönem	400 ml /dekar	90 gün

#### İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:

Tavsiye dozu üzerinden bir depo için hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Aletin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Aletin karıştırıcısı çalışır vaziyette iken ilaçlı su tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek kalan su miktarı tanka konur. İlaçlı suyla iyice karıştıktan sonra ilaçlamaya başlanır. İlaçlama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.

#### KULLANIM ŞEKLİ :

- JETANAL COM, yabancı otların 2-4 yapraklı oldukları genç dönemlerinde kullanılmalıdır.
- İyi bir kaplama ilaçlama yapacak şekilde yeterli su kullanılmalıdır. İlaçlamaya başlamadan önce aletinizle kalibrasyon yapınız. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litredir.
- JETANAL COM, hava sıcaklığı 25°C'nin üzerinde ise ilaçlama yapılmamalı, günün serin saatlerinde kullanılmalıdır.
- Yağmur ve çiğden ıslanmış yabancı otlara ilaç atılmamalıdır.
- İlaçlamadan sonra 6 saat içinde yağmur olmamalıdır.

#### DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :

JETANAL COM adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C1, 5 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için JETANAL COM'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup C1,5 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.



Akça çiçeği  
(*Thlaspi arvensis*)



Ballıbaba  
(*Lamium spp.*)



Şahtere  
(*Fumaria sp.*)

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- Bal arılarına az zehirlidir.
- Balıklara zehirlidir. Su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- İlaçlı mahlülün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.
- Bekleme süresine uyunuz.
- Tıkanmış adaptörleri ağzınızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.
- Kullanılan alet ve edavatı iyice temizlemeden diğer mücadele işleminde kullanmayınız.
- Boş ilaç kaplarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

**DEPOLAMA DURUMU :** Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

#### KARIŞABİLİRLİK :

Ethofumesate, Diclofop-methyl ve Deltamethrin terkipli ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir.



YABANCI  
OT İLACI

# HERBISİT

JETANAL  
COM

Phenmedipham 129 g/l +  
Desmedipham 34 g/l



279