

M

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

Midfield[®] 5EC


Etkili Madde : 50 g/l Quizalofop-p-ethyl
Ethyl (R)-2- [4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy) phenoxy]propionate

GRUP A,1 HERBİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ: Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulanık görme vs.

İLK YARDIM: Zehirlenme anında doktor çağırın, ilaç ambalaj veya etiketini birlikte götürün. İlaç ile temas eden kısımları bol su ve sabunla yıkayın. Hastayı ilaçlama sahasından hemen uzaklaştırın, istirahat ettirin. İlaç ile bulaşık elbiselerini çıkarın. Hastayı kendinde ise sabunlu su ile kusturun. Solunum yavaşlamışsa suni solunum yaptırın. Baygın halde bulunan kişilere hiçbir şey yedirmeyiniz, içirmeyiniz ve de kusturmayınız.

ANDİTODU: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.



TEHLİKE
ÖZELLİĞİ :



Xn: Zararlı

İÇİNDEKİLER :

Quizalofop-p-ethyl ve diğer katkı maddeleri içerir.

UYGULAYICI ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

R10: Alevlenebilir.

R20/21: Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.

R22: Yutulması halinde zararlıdır.

R 38: Cildi tahriş eder.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S36/37: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin



KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR:

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Kullanma dozu ve Dönemi
Kırmızı mercimek	Adi Ayrık (<i>Agropyron repens</i>)	100 ml/da Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde çıkış sonrası
	Yabani Yulaf (<i>Avena sterilis</i>) Tilki kuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Kendi gelen Buğday (<i>Triticum durum</i>) Kendi gelen Arpa (<i>Hordeum vulgare</i>)	75 ml/da Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde çıkış sonrası
Pamuk	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	75-100 ml/da, Tohumdan gelenlerde düşük, Rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır
Soya Fasulyesi	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Karadarı (<i>Panicum spp.</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Köpek dişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Tilki kuyruğu (<i>Alopecurus sp.</i>) Yabani kuş yemi (<i>Phalaris sp.</i>)	100 ml/da. Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu devrede, çıkış sonrası
Domates	Köpek dişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	100 ml/da, domatesler 15-20 cm boyda, otlar 3-6 yapraklı dönemde çıkış sonrası
Ayçiçeği	Köpek dişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Yapışkan Darı (<i>Setaria sp.</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Tilki kuyruğu (<i>Alopecurus sp.</i>) Çayır püskülü (<i>Poa sp.</i>) Brom (<i>Bromus sp.</i>) Yabani arpa (<i>Hordeum sp.</i>) Karadarı (<i>Panicum spp.</i>)	100 ml/da. Ayçiçeği ve yabancıotlar 3-4 yapraklı olduğu çıkış sonrası
Bağ	Köpek dişi ayrığı (<i>Cynodon dactylon</i>) Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml/da, Köpek dişi 15-20 cm, Kanyaş 2-3 kardeşle iken
Şeker Pancarı	Yabani yulaf (<i>Avena fatua</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Hububat halazası (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Brom (<i>Bromus sp.</i>)	75-100 ml/da, Yıllık yabancı otlarda düşük, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.
Soğan	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Yapışkan Darı (<i>Setaria sp.</i>)	100 ml/da. Soğan 15-20 cm boyunda, Kanyaş 3-5 yaprak, Darıcan ve Yapışkan Darınının 10 - 15 cm boyda iken

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Gerekli miktarda ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama aleti yarısına kadar su ile doldurularak içine karışım dökülür ve kalan su miktarı ilave edilerek karıştırılır.

KULLANMA ŞEKLİ: İlaç yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu ve hızlı bir gelişme gösterdikleri genç dönemlerinde (Kanyaş için bu dönem yabancı otların 30 cm oldukları devredir) otların üzerine püskürtülmek sureti ile kullanılır. İlaçlamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Yabancı otların gelişmelerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıkta uygulama yapılmamalıdır.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ : MIDFIELD 5 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A,1 olarak sınıflandırılmış bir herbistir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MIDFIELD 5 EC in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup A,1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.



Adi Ayrık
(*Agropyron repens*)



Köpek dişi ayrığı
(*Cynodon dactylon*)



Brom
(*Bromus sp.*)



Yapışkan Darı
(*Setaria sp.*)

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Alkali ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- Balıklara zehirlidir, sulara karıştırmayınız.
- Depoda başka ilaçlarla karışmasına mani olunuz.
- Boş ilaç kaplarını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Tohumla temas ettirmeyiniz.
- Buğdaygillere karşı fitotoksiktir.

DEPOLAMA DURUMU VE DİĞER BİLGİLER:
Normal (Serin ve kuru) depolama şartlarında 2yil depolandığı taktirde ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.



YABANCI
OT İLACI

HERBİSİT

MIDFIELD
5 EC

Quizalofop-p-ethyl 50 g/l



293