



EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

Nuance[®]forte

AKTİF MADDE : 150 g/l Fluazifop-P-butyl
butyl (R)-2-[4-(5-trifluoromethyl-2- pyridyloxy) phenoxy]propionate

GRUP


A,1

HERBİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ : Yutulması halinde karın ağrısı, ishal, mide bulantısı ve kusma.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ : İlaç göze değmiş ise göz kapaklarını açık tutarak temiz ve bol su ile 15 dakika yıkayın.Yutulmuş ise hastayı kusturmayınız. Doktor çağırınız, ilaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

ANTİDOTU : Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır. Zehirlenme halinde en yakın hastaneye yada Zehir Danışma Merkezi'ne başvurulmalıdır.
Tedavi : Mideyi, mide muhteviyatını solunum yollarına kaçmamasına özen göstererek yıkayınız. Sonra belirtilere göre tedavi uygulayınız.



TEHLİKE ÖZELLİĞİ :



Xn :
Zararlı



N :
Çevre
için
tehlikeli

İÇİNDEKİLER : Fluazifop-P-butyl ve diğer katkı maddeleri içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

R63: Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S29: Kanalizasyona boşaltmayın.

S36/37/39: Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.

S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S60: Atığın ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin.

S61: Çevreye saliverilmesinden kaçınınız. Özel kullanım talimatına / Güvenlik bilgi formuna başvurun.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :

NUANCE FORTE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A,1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için NUANCE FORTE'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A,1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR :

BİTKİ ADI	YABANCI OT ADI	KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ	SON İLAÇ İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Pamuk	Kaynaş (Sorghum halepense)	100 ml/da Kaynaş 15-25 cm boyda iken, 1 ay sonra yeniden çıkışlar olursa ikinci uygulama yapılır.	2 ay
Soğan	Kısır yabani yulaf (Avena sterilis) Darıcan (Echinochloa crus-galli) Kaynaş (Sorghum halepense)	50 ml/da yabani yulafın kardeşlenme döneminde 100 ml/da soğanın 2 yapraklı devresinde	1 ay
Bağ	Kaynaş (Sorghum halepense) Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)	100 ml/da kaynaş 6-10 yapraklı veya 15-30 cm boyda iken 150 ml/da köpek dişi ayrığı çiçeklenme öncesi devrede	1 ay
Yeşil Mercimek	Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)	50 ml/da Bitkiler 2-6 yapraklı Çiçeklenme öncesi yabancı otlar ise 3-5 yapraklı iken	2 ay
Kırmızı Mercimek	Yabani yulaf (Avena sativa) Kenci gelen hububat (Triticum spp. Hordeum spp.)		
Şekerpancarı	Kaynaş (Sorghum halepense) Yabani yulaf (Avena sterilis)	100 ml/da kaynaş 15-30 cm boyda iken 50 ml/da yabani yulafın kardeşlenme döneminde	2 ay

KULLANMA ŞEKLİ : NUANCE FORTE, geniş yapraklı kültür bitkilerinde sorun olan gramineae familyasındaki tek ve çok yıllık yabancı otlara karşı çıkıştan sonra (post-em) kullanılan sistemik etkili, seçici bir yabancı ot ilacıdır. Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre göz önünde bulundurmak kaydı ile NUANCE FORTE geniş yapraklı kültür bitkilerinin gelişmelerinin her döneminde emniyetle kullanılabilir. İlaçlama sırasında yabancı otların aktif gelişme içerisinde olmaları ve ilaçlama öncesi kültürel işlemlerle çok yıllık yabancı otların rizonlarının parçalanmış olması, ilaçlamadan daha iyi sonuç alınmasını sağlar. İlaçlama iyi kaplama yapılması için uygun basınç ve küçük damlacıklar gereklidir. İlaçlama için uygun basınç 3 atmosfer ve en uygun meme tipi yelpaze memelidir. Her türlü ilaçlama aletiyle uygulanabilir. Yer aletleriyle 20-40 litre su kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ: Gerekli miktardaki ilaç az bir suyla ayrı bir kaptaki karıştırılır. Yarısına kadar su doldurulmuş ve karıştırıcısı çalışmakta olan ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile 1 dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir. NUANCE FORTE ilaçlamadan 1 saat sonra yağın yağmurdan etkilenmez.



Kaynaş
(Sorghum halepense)



Yabani Yulaf
(Avena spp.)



Darıcan
(Echinochloa crus galli)

KARIŞABİLİRLİK DURUMU : Tavsiye olunan dozlarda Lambda-cyhalothrin, Chlorthalonil ve Pirimicarb terkipli ilaçlarla karışabilir. Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım yapılması tavsiye edilir. Bazı Kültür bitkileri için yapılan özel tavsiyeler dışında geniş yapraklı yabancıotlara etkili diğer herbisitlerle karıştırılarak kullanılmasından kaçınılmalıdır. Bu ilaçlar NUANCE FORTE tatbikatından 7 gün sonra kullanılmalıdır.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- Arılara zehirsizdir.
- Balıklara zarar vermemek için ilaç ve atıklarını sulara bulaştırmayınız.
- Boş ilaç ambalajlarını başka amaçla kullanmayınız.
- İlaçlamadan sonra kullandığınız aleti iyice yıkayınız.
- İlaçlamadan sonra ve her hangi bir şey yiyip içmeden sigara kullanmadan önce ellerinizi ve ilaca maruz kalmış vücut kısımlarınızı yıkayınız.

DEPOLAMA DURUMU VE DİĞER BİLGİLER : Normal (Serin ve Kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.



YABANCI
OT İLACI

HERBİSİT

NUANCE
FORTE

Flazifop-P-butyl 150 g/l



299

