

P

KURU AKIŞKAN (DF)

Planstar® DF

ETKİLİ MADDE : % 75 Tribenuron-methyl
methyl 2-[[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl) methylamino]
carbonyl] amino] Sulfonylurea] benzoate

GRUP

B,2

HERBİSİT

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ : Gözde hafif iritasyon yapabilir. Herhangi bir klinik zehirlenme olayına rastlanmamıştır. Göz teması halinde göz bol su ile yıkanmalıdır.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ : Doktor çağırın, ilaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz. Hastayı ilaçı yerden uzaklaştırın. İlaç ile bulaşmış elbiseleri çıkarın. Deriye bulaşmış ise bol su ve sabunla yıkayın. Hastayı sakin bir yerde tutunuz.

ANTİDOTU : Özel bir antidotu yoktur.



50 cc

TEHLİKE
ÖZELLİĞİ :



Xi: Tahriş edici

İÇİNDEKİLER : Tribenuron-methyl ve diğer katkı maddeleri içerir.

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMALARI :

R43: Cilt ile temasında alerji yapabilir


GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S26: Göz ile temasından sakının.

S37: Uygun koruyucu eldiven takın.

S46: Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız
hemen bir doktora başvurun.
(Mümkünse etiketini gösterin.)



PLANSTAR buğday ve arpada geniş yapraklı yabancı ot mücadelesinde kullanılan etki alanı geniş bir yabancı ot ilacıdır. Düşük dozlarda kullanılır seçiciliği çok yüksektir.

1.DOZ ; Dekara 1 gram
Kontrol edilen yabancı otlar :

Arap baklası	<i>Vaccaria pyramidata</i>
Ballıbaba	<i>Lamium sp.</i>
Düğün çiçeği	<i>Ranunculus arvensis</i>
Gelincik	<i>Papaver rhoeas</i>
Gönül Hardalı	<i>Myagrum perfoliatum</i>
Kokarot	<i>Bifora radians</i>
Köygöçürene	<i>Cirsium arvense</i>
Sarı ot	<i>Boreava orientalis</i>
Sedef otu	<i>Buglossides arvensis</i>
Sinek kapan	<i>Silene copoidea</i>
Yabani cam çiçeği	<i>Geranium tuberosum</i>
Yabani çivit otu	<i>Isatis tinctoria</i>
Yabani fiğ	<i>Vicia spp.</i>
Yabani turp	<i>Raphanus sp.</i>
Yabani hardal	<i>Sinapis arvensis</i>
Boynuzlu yoğurt otu	<i>Galium tricornutum</i>
Tarla yapışkan otu	<i>Asperula arvensis</i>
Toplu iğne hardalı	<i>Neslia paniculata</i>

2.DOZ ; a) Dekara 1.5 gram veya
b) Dekara 1 gram + % 0.1 yayıcı yapıştırıcı
Kontrol Edilen Yabancı otlar :

Gökbaş	<i>Centaurea depresse</i>
--------	---------------------------

UYGULAMA ZAMANI : Hububatın 2 yapraklı devresinden kın devresine (başak kın içerisinde) kadar olan dönem içinde güvenle kullanılabilir. PLANSTAR tatbikat zamanı açısından büyük esneklik sağlandığından, uygulama zamanı, problem olan yabancı otların büyüme devrelerine göre tesbit edilir. En iyi netice tatbikat, yabancı otlar en az 2 yapraklı devrede iken ancak 15 cm yükseklik veya çapa ulaşmadan ve yabancı otların üstü hububat tarafından kapatılmadan yapıldığında alınır. Gökbaş otunun çok olduğu tarlalarda ilaçlama Gökbaş'ın 7-8 yapraklı ve 8-9 cm çapa ulaştığı rozet döneminde yapılmalıdır. Aynı yerde aynı etkili mekanizmasına sahip herbisitler üst üste ve uzun yıllar boyunca kullanıldığında bazı yabancı ot türlerinin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hakim hale geldiği görülebilir. Sonuçta herbisitlerin tavsiye edilen dozları ile bu yabancı otlara karşı yeterli etki sağlanamaz. Başka etki mekanizmasına sahip herbisitlerin değişimli olarak kullanılması veya bu tür herbisitlerle tank karışımı yapılması ayrıca toprak işleme gibi kültürel işlemler yabancı otların dayanıklılık kazanmasını geciktirir veya engeller.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI : Gerekli miktardaki ilaç az bir suyla önce bir kaptan karıştırılır. Yarısına kadar su dolu ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır. Karıştırma ilacın düzgün dağılımı ve tatbikatı için gereklidir. Tatbikatı için hazırlanmış PLANSTAR Karışımlarını bir parçalanma söz konusu olabileceğinden 24 saatten fazla bekletmeyiniz.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ : PLANSTAR adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için PLANSTAR'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B,2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU : Genel olarak bütün dozlarda yayıcı yapıştırıcı kullanılabilir. Bu, PLANSTAR'ın bazı yabancı otlar üzerindeki etkisini arttırabileceği gibi etkinin daha çabuk ortaya çıkmasında neden olabilir. 2,4 D Ester ve Amin terkipli ilaçlarla karıştırılıp kullanılabilir.



Arap baklası
(*Vaccaria pyramidata*)



Düğün çiçeği
(*Ranunculus arvensis*)



Sedef otu
(*Buglossides arvensis*)

ÜRÜN MÜNAVEBESİ: Buğday ve arpadaki PLANSTAR kullanımından sonra normal ekim münavebesine giren her kültür bitkisi ekilebilir.

Not: Üründe bir zarar ortaya çıkabileceğinden PLANSTAR'ı anormal hava şartları ve kuraklık nedeniyle baskıya ve zararlılar tarafından hasara uğratılmış bitkilere tatbik etmeyiniz.

Genel bilgiler: PLANSTAR kökler ve yeşil aksam yoluyla yabancı otlar tarafından bünyelerine alınır. Topraktaki kalıcı etkisi kısadır. Hassas yabancı otların büyümesi tatbikattan kısa süre sonra durur. Ancak ölüm belirtileri büyüme şartlarına bağlı olarak tatbikattan 1-3 hafta sonra sıcak ve nemli şartlar PLANSTAR'ın etkisini hızlandırırken, soğuk ve kuru şartlar bunu geciktirir. PLANSTAR uçucu ve yanıcı değildir. İlaçlama aletlerini aşındırmaz.

DEPOLAMA VE ATIKLARIN İMHASI :

- Depolama ve atıkların imhası sırasında su, gıda maddeleri ve yemlere bulaştırmayınız.
- Gübre, insektisit, fungusit ve tohumlardan ayrı yerde depolayınız
- Ambalajı yeniden kullanmayınız.
- Boş ambalajı ve kullanılmayan ilacı su kaynaklarından uzak emin bir yere gömünüz veya tavsiye edilen diğer yollarla yok ediniz. Sulara bulaştırmayınız.

DEPOLAMA DURUMU : Normal (Serin ve Kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.



YABANCI
OT İLACI

HERBISİT

PLANSTAR
DF

Tribenuron-methyl % 75

