

# B

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

# Buckstar® 25EC

**ETKİLİ MADDE :** 250 g/l Oxadiazon  
5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-isopropoxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-one

GRUP | E,14 | HERBİSİT

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:** Burun, boğaz,gözde ve deride kaşıntı,mide bulantısı.

**ILK YARDIM:** Zehirlenme anında doktor çağırın, ilaç ambalaj veya etiketini birlikte götürün. İlaç ile temas eden kısımları bol su ve sabunla yıkayın. Hastayı ilaçlama sahasından hemen uzaklaştırın, istirahat ettirin. İlaç ile bulaşık elbiselerini çıkarın. Hastayı kendinde ise sabunlu su ile kusturun. Solunum yavaşlamışsa suni solunum yaptırın. Baygın halde bulunan kişilere hiçbir şey yedirmeyiniz, içirmeyiniz ve de kusturmayınız.

**ANDİTODU:** Özel bir antidotu yoktur. Hastanın midesi yıkanmalı ve belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.



1 lt



**TEHLİKE  
ÖZELLİĞİ :**



Xn:  
Zararlı



N:  
Çevre  
için  
tehlikeli

**İÇİNDEKİLER :** Oxadiazon ve diğer katkı maddeleri içerir.

**UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :**

**R10:** Alevlenebilir.

**R48/20 : Zararlı:** Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.

**R38 :** Cildi tahriş eder.

**R63 :** Anne karnındaki çocuğa zarar riski olasılığı

**R65 : Zararlı :** Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir

**R67 :** Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir

**R50/53 :** Sudaki organizmalar için çok toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

**S---GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI :**

**S2:** Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

**S36/37 :** Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.

**S46 :** Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

**S60 :** Atığını ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin

**S61 :** Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına / Güvenlik Bilgi Formuna bakın

**S62 :** Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya etiketi gösterin.



#### KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR :

| Bitki Adı | Yabancı Ot Adı   | Kullanma dozu ve Dönemi   |
|-----------|--|---|
| Karanfil  | Horozibiği<br>( <i>Amaranthus albus</i> )<br>Kazayağı-Sirken<br>( <i>Chenopodium album</i> )<br>Semizotu<br>( <i>Portulaca oleracea</i> )                                  | 400 ml /da<br>Köklendirilmiş<br>karanfil  |
|           | Serçe dili<br>( <i>Stellaria media</i> )<br>Yabani hardal<br>( <i>Sinapis arvensis</i> )<br>Eşek marulu<br>( <i>Sonchus spp</i> )<br>Darıcan<br>( <i>Echinochloa spp</i> ) | çeliklerinin tarlaya<br>şşırtılmasından<br>sonra fakat ot çıkışı<br>başlamadan önce |
|           |  |   |



Horozibiği  
(*Amaranthus albus*)



Semizotu  
(*Portulaca oleracea*)



Serçe dili  
(*Stellaria media*)



YABANCI  
OT İLACI

# HERBİSİT

BUCKSTAR  
25 EC

250 g/l Oxadiazon



#### İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Gerekli miktarda ilaç önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama aleti yarısına kadar su ile doldurularak içine karışım dökülür ve kalan su miktarı ilave edilerek karıştırılır.

Debara en az 50 litre su kullanılmalı ve toprak yüzeyi düzgün bir şekilde ıslatılmalıdır. Sonraki günlerde, ilacın film tabakasının bozulmaması için, toprak işlenmemeli ve nemli bulundurulmalıdır.

Bu itibarla, damlama sulama düzeni yoksa sulamalarda süzgeç kullanılmalıdır.

#### DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :

BUCKSTAR 25 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup E,14 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için BUCKSTAR 25 EC'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup E,14 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer herbisitlerle bir karışıma engeli bulunmamaktadır. Bununla birlikte genel bir ilke olarak fiziksel karışabilirlik bakımından bir ön test yapılmalıdır.

#### DEPOLAMA DURUMU VE DİĞER BİLGİLER:

Normal (Serin ve kuru) depolama şartlarında 2 yıl depolandığı takdirde ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN

##### DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- Balıklara zehirlidir, sulara karıştırmayınız.
- Depoda başka ilaçlarla karışmasına mani olunuz.
- Boş ilaç kaplarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.
- Usulüne uygun olarak imha ediniz.

